

*Santé pour tous*

**VIH/Sida et Infections  
Sexuellement Transmissibles  
au Rwanda**

**Résultats de l'Enquête  
Démographique et de Santé  
Rwanda 2000**

# **VIH/Sida et Infections Sexuellement Transmissibles au Rwanda**

**Résultats de l'Enquête  
Démographique et de Santé  
Rwanda 2000**

Office National de la Population  
Kigali, Rwanda

ORC Macro  
Calverton, Maryland, USA

Juin 2002

Citation recommandée pour ce document :

Office National de la population (ONAPO) [Rwanda] et ORC Macro. 2002. *VIH/Sida et Infections Sexuellement Transmissibles au Rwanda : Résultats de l'Enquête Démographique et de Santé, Rwanda 2000*. Calverton, Maryland, USA : ORC Macro.

Des informations complémentaires sur l'EDRS-II peuvent être obtenues auprès de l'Office National de la population, BP 914, Kigali, Rwanda. Téléphone : (250) 7 7476 / 7 4793, Fax : (250) 7 4267. E-mail : [ONAPO@RWANDATEL1.RWANDA1.COM](mailto:ONAPO@RWANDATEL1.RWANDA1.COM). Internet : [www.rwandapop.org](http://www.rwandapop.org). Des renseignements concernant le programme MEASURE DHS+, des copies de ce rapport ainsi que des copies du rapport final de l'enquête peuvent être obtenus auprès de ORC Macro, 11785 Beltsville Drive, Calverton, MD 20705, USA (Téléphone 301-572-0200; Téléc 198116; Fax 301-572-0999; E-mail : [reports@macroint.com](mailto:reports@macroint.com); Internet : [www.measuredhs.com](http://www.measuredhs.com)).

## Introduction

Ce rapport sur le VIH/Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles au Rwanda a été préparé pour la *XIV<sup>e</sup> Conférence Internationale sur le Sida* de Barcelone, Espagne, Juillet 2002. Le texte est une réimpression du rapport final de la deuxième Enquête Démographique et de Santé au Rwanda (EDSR-II)<sup>1</sup>.


La deuxième Enquête Démographique et de Santé au Rwanda (EDSR-II), commanditée par le Ministère de la Santé, a été réalisée de juin à novembre 2000 par l'Office National de la Population (ONAPO) avec l'assistance technique du programme international des Enquêtes Démographiques et de Santé (DHS) de ORC Macro. L'EDSR-II a été exécutée grâce à l'appui financier de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF).

L'EDSR-II avait pour objectif d'estimer de nombreux indicateurs socio-économiques, démographiques et sanitaires au niveau de l'ensemble de la population et au niveau des sous-populations des femmes de 15-49 ans, des enfants de moins de 5 ans et des hommes de 15-59 ans. Afin d'atteindre ces objectifs trois types de questionnaires ont été utilisés : un questionnaire ménage portant sur tous les membres des ménages et sur certaines caractéristiques des logements ; un questionnaire individuel pour les femmes de 15-49 ans et leurs enfants et un questionnaire individuel pour les hommes de 15-59 ans.

L'EDSR-II a porté sur un échantillon représentatif au niveau national. Les résultats sont disponibles pour le milieu urbain, le milieu rural, la ville de Kigali/PVK et onze préfectures. Au total, 9 696 ménages, 10 421 femmes et 2 717 hommes ont été enquêtés avec succès.

---

<sup>1</sup> Office National de la population (ONAPO) [Rwanda] et ORC Macro 2001. *Enquête Démographique et de Santé, Rwanda 2000*. Kigali, Rwanda et Calverton, Maryland, USA : Ministère de la Santé, Office National de la Population et ORC Macro.



Le Syndrome d'Immuno Déficience Acquise (Sida) est une maladie dont le mode de transmission est essentiellement sexuel. Cette maladie, une fois contractée, conduit à la destruction progressive et irréversible du système immunitaire humain. Le sida est devenu actuellement une pandémie en Afrique subsaharienne et sa prévalence ne cesse de s'accroître. Parallèlement, les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) accusent une prévalence élevée.

L'ampleur du problème du Sida et des IST est conditionnée par beaucoup de facteurs dont l'existence de certains tabous et croyances fortement ancrés dans les traditions, le faible niveau d'instruction de la population, la dégradation de la situation socio-économique accentuant la pauvreté, certains mouvements de population et la faible prise en charge des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et des personnes vivant avec le VIH.

Ainsi, à l'EDSR-II, des questions ont été posées sur les différents aspects suivants :

- la connaissance de l'existence du VIH/Sida, des moyens de prévention et de ses modes de transmission;
- la perception du VIH/Sida;
- l'aspect social de la prévention du VIH/Sida;
- le test du VIH/Sida;
- la connaissance des Infections Sexuellement Transmissibles (IST);
- la prévalence déclarée des IST et le comportement adopté;
- la protection du partenaire sexuel en cas d'infection;
- le nombre de partenaires sexuels;
- la connaissance et l'utilisation du condom.

## 1.1 CONNAISSANCE DU VIH/SIDA

Le degré de connaissance qu'a une population d'une maladie détermine l'attitude et le comportement que cette population manifeste vis-à-vis de la maladie. L'un des objectifs de l'EDSR-II était donc d'étudier le niveau de connaissance du VIH/Sida par la population du Rwanda. Les résultats sont présentés au tableau 1.1.

La quasi-totalité de la population du Rwanda connaît l'existence du VIH/Sida : 99,6 % pour les femmes et 99,7 % pour les hommes. Quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques, le niveau de connaissance se situe entre 99 % et 100 %.

De même, la quasi-totalité des femmes (96 %) connaissent, au moins, un moyen pour éviter de contracter le VIH/Sida (tableaux 1.2.1). À l'opposé, seulement 4 % des femmes ne connaissent aucun moyen pour l'éviter, ou ne connaissent pas le VIH, ou ne savent pas s'il peut être évité, ou encore pensent que le VIH ne peut être évité. Les quatre moyens d'éviter la transmission du VIH les plus connus sont, par ordre d'importance, l'abstinence sexuelle (76 %), l'utilisation du condom (37 %), le fait d'avoir un seul partenaire sexuel (21 %) et le fait d'éviter de partager les lames et rasoirs (20 %).

**Tableau 1.1 Connaissance du VIH/Sida**

Pourcentage de femmes et d'hommes qui ont entendu parlé du VIH/Sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Femmes		Hommes	
	Pourcentage qui ont entendu parler du VIH/Sida	Effectif	Pourcentage qui ont entendu parler du VIH/Sida	Effectif
<b>Groupe d'âges</b>				
15-19	99,2	2 617	99,4	762
20-24	99,9	1 907	100,0	433
25-29	99,8	1 592	99,4	359
30-34	99,9	1 273	100,0	269
35-39	99,9	1 202	99,9	262
40-44	99,7	1 058	99,2	273
45-49	99,3	772	100,0	175
50-54	-	-	100,0	126
55-59	-	-	100,0	60
<b>État matrimonial</b>				
Jamais en union et n'ayant jamais eu rapports sexuels	99,3	3 059	99,4	783
Jamais en union ayant des rapports sexuels	99,3	490	100,0	440
En union	99,8	5 052	99,7	1 416
Divorcé(e)/Séparé(e)/veuf (Veuve)	99,8	1 820	100,0	78
<b>Milieu de résidence</b>				
Kigali Ville/PVK	99,9	553	99,8	186
Autres villes	100,0	1 243	100,0	350
Total urbain	100,0	1 796	99,9	537
Rural	99,6	8 625	99,6	2 180
<b>Préfecture</b>				
Butare	99,6	922	100,0	222
Byumba	99,2	878	100,0	255
Cyangugu	99,9	782	100,0	241
Gikongoro	99,4	618	100,0	171
Gisenyi	99,8	1 163	99,3	291
Gitarama	99,9	1 137	99,0	266
Kibungo	99,8	890	100,0	236
Kibuye	99,0	561	99,5	148
Kigali Ville (PVK)	99,9	553	99,8	186
Kigali Rural	99,7	1 434	100,0	347
Ruhengeri	99,5	1 140	99,0	278
Umutara	99,6	345	99,0	74
<b>Niveau d'instruction</b>				
Aucun	99,1	2 549	99,0	473
Primaire/Alphabétisation	99,8	6 763	99,8	1 857
Secondaire ou plus	100,0	1 109	99,9	387
<b>Ensemble</b>	99,6	10 421	99,7	2 717

Selon le milieu de résidence, la proportion de femmes qui ne connaissent pas le VIH/Sida, ou ne savent pas s'il peut être évité, ou pensent qu'il ne peut être évité est la plus élevée chez les femmes du groupe d'âges 15-19 ans (7 %), celles qui n'ont jamais été en union et n'ont jamais eu de rapports sexuels (6 %), celles vivant en milieu rural (5 %), celles n'ayant aucune instruction (8 %) et celles vivant dans la préfecture de Ruhengeri (7 %).

Tableau 1.2.1 Connaissance des femmes des moyens d'éviter de contracter le VIH/Sida  
 Pourcentage de femmes qui connaissent différents moyens d'éviter de contracter le VIH/Sida selon les caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Moyens d'éviter le VIH/Sida										Effectif de femmes				
	S'abstenir de rapports sexuels	Utiliser les condoms	Avoir un partenaire unique	Éviter partenaires multiples	Éviter les prostituées	Éviter qui a plusieurs partenaires	Éviter les transfusions	Éviter injections	Éviter de partager lames/raisoirs	Éviter de moudre les piqures de moustiques		Chercher la protection des guérisseurs traditionnels	Autres moyens	Ne connaît pas VIH/Sida ou le VIH/Sida ne peut être évité	Pense que le VIH/Sida ne peut être évité
<b>Groupe d'âges</b>															
15-19	77,8	33,9	10,4	0,9	10,7	1,7	1,8	8,1	17,9	0,1	5,3	2,1	5,7	1,2	2 617
20-24	79,4	44,3	21,3	1,4	10,2	2,0	2,3	11,5	20,1	0,2	6,8	2,2	2,5	0,5	1 907
25-29	74,9	40,1	25,7	1,9	11,6	2,7	2,2	13,6	21,9	0,2	8,0	1,9	2,7	0,8	1 592
30-34	75,4	39,7	25,9	1,4	13,2	2,3	2,8	11,6	20,4	0,1	8,3	1,7	2,0	0,6	1 273
35-39	74,6	33,4	26,9	1,8	13,0	2,0	2,1	11,5	17,8	0,0	7,2	1,3	2,4	0,6	1 202
40-45	75,0	33,7	26,6	1,5	13,9	2,4	2,2	10,3	19,6	0,3	8,4	1,1	2,4	0,7	1 058
45-49	72,1	28,0	22,9	2,2	13,7	2,5	1,8	10,0	20,3	0,2	7,3	1,7	3,7	1,2	772
<b>État matrimonial</b>															
Jamais en union et n'ayant jamais eu rapports sexuels	80,8	33,8	8,6	0,8	9,9	1,7	1,8	9,4	18,9	0,1	5,9	2,3	5,2	0,8	3 059
Jamais en union ayant des rapports sexuels	83,5	57,7	13,5	2,1	8,3	2,8	4,2	11,5	20,4	0,2	9,6	3,1	1,4	1,3	490
En union	72,0	36,5	30,6	1,8	13,1	2,4	2,0	11,7	21,1	0,1	8,1	1,5	2,7	0,8	5 052
Divorcée/Séparée/Veuve	78,6	37,8	17,9	1,7	12,7	2,2	2,4	10,1	16,0	0,2	5,3	1,6	2,5	0,6	1 820
<b>Milieu de résidence</b>															
Kigali Ville/PVK	77,1	52,7	18,0	1,3	6,4	3,0	2,6	11,2	16,7	0,2	4,7	2,0	1,8	0,4	553
Autres villes	79,0	55,4	26,2	2,2	11,1	2,8	3,5	13,1	25,7	0,2	9,1	2,3	0,9	0,5	1 243
Total urbain	78,4	54,6	23,7	1,9	9,7	2,8	3,2	12,5	22,9	0,2	7,7	2,2	1,2	0,5	1 796
Rural	75,8	33,3	20,6	1,4	12,3	2,0	1,9	10,4	18,9	0,1	6,9	1,7	3,8	0,9	8 625
<b>Préfecture</b>															
Butare	79,9	40,3	19,6	3,4	10,3	3,4	2,9	14,7	22,9	0,1	7,9	1,6	2,6	0,7	922
Byumba	75,5	37,3	23,3	2,4	7,5	2,4	2,3	9,4	19,1	0,1	5,4	3,2	4,4	0,8	878
Cyangugu	79,6	34,3	21,8	1,3	10,6	3,5	2,0	14,4	26,5	0,2	10,5	1,2	1,8	0,5	782
Gikongoro	79,5	27,5	18,4	1,3	8,0	2,3	2,3	10,1	17,0	0,0	7,8	1,1	4,1	0,9	618
Gisenyi	75,4	34,0	26,2	1,3	14,8	2,6	2,4	7,7	18,4	0,0	6,8	1,1	3,4	0,2	1 163
Citaroma	71,2	43,4	18,8	0,8	22,7	0,1	0,6	9,6	13,3	0,0	4,1	2,4	2,1	0,6	1 137
Kibungo	78,0	39,6	19,2	1,1	7,2	2,0	2,9	13,7	23,0	0,3	9,2	2,8	3,8	0,7	890
Kibuye	76,9	21,1	23,4	0,6	11,4	3,0	1,7	9,6	17,2	0,1	12,0	0,7	3,3	1,1	561
Kigali Ville (PVK)	77,1	52,7	18,0	1,3	6,4	3,0	2,6	11,2	16,7	0,2	4,7	2,0	1,8	0,4	553
Kigali Rural	80,3	41,5	18,5	1,5	5,8	2,0	2,2	10,8	19,0	0,2	6,8	1,8	3,3	0,8	1 434
Ruhengeri	74,4	31,7	24,8	1,4	14,1	1,5	2,5	9,0	21,7	0,2	6,9	0,9	5,0	1,9	1 140
Umutara	57,7	30,8	18,5	0,8	31,4	0,2	0,6	9,4	20,1	0,2	1,2	3,1	4,3	1,2	345
<b>Niveau d'instruction</b>															
Aucun	72,0	26,1	21,6	1,5	12,2	2,2	1,6	7,1	15,3	0,0	5,6	1,4	6,1	1,4	2 549
Primaire/Alphabétisation	76,8	37,5	20,4	1,3	11,9	2,0	1,9	10,7	19,2	0,1	6,6	1,7	2,8	0,7	6 763
Secondaire ou plus	82,8	58,5	24,3	2,4	11,1	2,9	4,9	19,3	31,4	0,6	12,8	2,9	0,1	0,1	1 109
Ensemble	76,3	36,9	21,1	1,5	11,9	2,1	2,1	10,7	19,6	0,1	7,0	1,8	3,3	0,8	10 421

Tableau 1.2.2. Connaissance des hommes des moyens d'éviter de contracter le VIH/Sida  
 Pourcentage d'hommes qui connaissent différents moyens d'éviter de contracter le VIH/Sida selon les caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Moyens d'éviter le VIH/Sida											Effectif d'hommes				
	S'abstenir de rapports sexuels	Utiliser les condoms	Avoir un seul partenaire	Éviter partenaires multiples	Éviter les prostituées	Éviter qui a plusieurs partenaires	Éviter les transfusions	Éviter les injections	Éviter de partager des seringues/ aiguilles/ rasoirs	Éviter d'em-brasser	Éviter les piqures de moustiques		Chercher des quérises traditionnelles	Autres moyens	Ne connaît pas si le VIH/Sida peut être évité	Pense que le VIH/Sida ne peut être évité
<b>Groupe d'âges</b>																
15-19	81,3	62,5	2,8	0,8	6,0	0,9	1,6	6,4	20,6	0,1	0,1	0,9	4,5	4,0	0,9	762
20-24	86,7	71,1	15,0	0,8	6,2	1,7	1,7	8,8	19,2	0,0	0,7	0,6	4,8	0,3	0,5	433
25-29	86,1	69,7	17,0	0,7	6,5	1,5	2,0	13,4	18,4	1,0	0,4	1,3	5,0	0,9	0,0	359
30-34	87,2	74,7	22,3	0,1	3,4	1,4	1,7	9,0	16,0	0,0	0,5	2,5	5,2	0,4	0,0	269
35-39	87,0	65,7	23,7	1,9	6,0	0,4	1,4	10,3	17,1	0,0	0,0	2,4	3,5	0,3	0,0	262
40-45	85,3	60,7	17,9	1,8	5,8	1,2	4,0	10,6	21,0	0,0	0,0	1,0	3,1	1,6	0,4	273
45-49	90,2	52,2	19,2	1,6	6,2	0,0	2,6	14,8	22,1	0,0	0,0	0,0	3,1	1,0	0,6	175
50-54	85,8	54,4	15,8	3,3	3,9	0,8	3,0	7,1	10,8	0,3	0,0	0,7	3,5	0,0	0,0	126
55-59	80,6	52,4	20,9	0,0	2,5	0,0	3,3	15,3	17,2	0,0	0,0	0,0	1,6	3,6	0,0	60
<b>État matrimonial</b>																
Jamais en union et n'ayant jamais eu rapports sexuels	82,6	60,0	3,2	0,2	5,8	0,8	2,0	7,5	19,7	0,5	0,4	0,9	4,9	4,0	0,8	783
Jamais en union ayant des rapports sexuels	88,3	83,8	8,7	1,6	6,2	1,7	1,4	10,9	19,3	0,2	0,3	0,2	4,1	0,0	0,4	440
En union	85,4	61,3	22,0	1,4	5,3	0,8	2,5	10,7	19,2	0,0	0,2	1,5	4,0	0,9	0,2	1 416
Divorcé/Séparé/Veuf	86,5	72,4	13,0	1,8	8,2	0,0	0,0	1,4	4,3	0,0	0,0	1,4	2,1	0,0	0,0	78
<b>Milieu de résidence</b>																
Kigali Ville/PVK	86,9	78,9	10,8	1,3	6,8	0,8	3,2	11,8	14,3	0,2	0,2	1,1	4,9	1,1	0,2	186
Autres villes	90,7	74,5	12,6	1,8	7,2	0,5	5,3	15,1	21,1	0,0	0,4	0,7	1,4	0,5	0,5	350
Total urbain	89,4	76,1	12,0	1,6	7,1	0,6	4,6	13,9	18,7	0,1	0,3	0,9	2,7	0,7	0,4	537
Rural	84,0	62,1	14,7	0,9	5,3	1,0	1,5	8,4	19,0	0,2	0,2	1,2	4,6	1,9	0,4	2 180
<b>Préfecture</b>																
Butare	88,0	68,2	9,3	1,0	3,0	0,6	1,7	11,8	23,1	1,0	0,5	0,5	4,6	1,7	1,0	222
Byumba	80,3	67,6	12,7	0,9	10,8	0,5	1,9	13,6	22,1	0,0	0,0	1,4	8,9	2,8	0,9	255
Cyangugu	89,5	58,1	9,7	0,4	5,6	0,4	1,6	10,5	19,8	0,0	0,0	2,0	5,6	2,4	0,8	241
Gikongoro	87,4	46,3	12,6	0,5	5,3	1,1	2,6	10,5	23,7	0,0	0,0	2,6	2,6	1,6	0,5	171
Gisenyi	93,2	68,7	18,4	1,4	2,0	1,4	2,0	7,5	19,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,7	0,7	291
Citarama	85,9	73,3	21,4	1,0	3,9	0,5	0,5	4,4	11,2	0,0	0,0	2,9	2,9	1,5	0,5	266
Kibungo	80,6	63,1	9,0	2,7	9,9	3,2	3,6	13,5	20,3	0,5	0,5	1,4	5,9	1,8	0,0	236
Kibuye	85,4	56,2	21,6	0,5	1,6	0,5	0,5	4,9	17,8	0,0	0,0	0,5	2,2	1,6	0,0	148
Kigali Ville (PVK)	86,9	78,9	10,8	1,3	6,8	0,8	3,2	11,8	14,3	0,2	0,2	1,1	4,9	1,1	0,2	186
Kigali Rural	79,5	65,5	11,2	1,6	9,2	0,4	4,0	10,8	16,1	0,4	1,2	0,0	5,6	0,8	0,0	347
Ruhengeri	82,7	63,5	18,3	0,0	3,0	1,0	1,0	7,1	23,4	0,0	0,0	1,0	3,0	2,5	0,0	278
Umataza	82,5	56,3	16,5	1,0	1,9	0,0	0,0	3,9	15,5	0,0	0,0	0,0	2,9	1,0	0,0	74
<b>Niveau d'instruction</b>																
Aucun	78,6	53,5	21,4	1,1	4,8	0,0	0,6	2,6	11,3	0,0	0,0	0,2	3,0	2,7	1,4	473
Primaire/Alphabétisation	85,2	64,8	11,1	1,0	6,0	1,2	1,8	9,7	20,2	0,3	0,4	1,1	4,2	1,7	0,2	1 857
Secondaire ou plus	92,7	79,5	19,9	1,3	5,2	0,8	5,1	17,2	22,2	0,1	0,0	2,6	6,1	0,1	0,0	387
Ensemble	85,1	64,9	14,1	1,1	5,7	0,9	2,1	9,5	18,9	0,2	0,2	1,1	4,2	1,6	0,4	2 717

Le niveau de connaissance des moyens de contracter le VIH/Sida est aussi élevé chez les hommes que chez les femmes (tableau 1.2.2). En effet, la quasi-totalité des hommes (98 %) connaissent, au moins, un moyen pour éviter de contracter le VIH/Sida. Le pourcentage de ceux qui ne connaissent pas le VIH/Sida ou ne savent pas s'il peut être évité est de 2 %, et celui de ceux qui ne connaissent aucun moyen d'éviter de le contracter ou pensent qu'il ne peut être évité, est quasiment nul.

Les moyens d'éviter la transmission du VIH les plus connus par les hommes sont identiques à ceux des femmes; cependant, les hommes sont, proportionnellement, plus nombreux que les femmes à évoquer l'abstinence sexuelle et l'utilisation du condom alors que les femmes ont cité plus souvent le fait d'avoir un seul partenaire sexuel. En effet, 85 % des hommes ont évoqué l'abstinence sexuelle (contre 76 % des femmes), 65 % ont évoqué l'utilisation du condom (contre 37 % des femmes), 19 % ont évoqué le fait d'éviter de partager les lames et rasoirs et 14 % le fait d'avoir un seul partenaire sexuel (contre 21 % des femmes).

La proportion d'hommes qui ne connaissent pas le VIH/Sida, ne savent pas s'il peut être évité ou pensent qu'il ne peut être évité (2 % dans l'ensemble) est un peu plus élevée parmi les hommes de 15-19 ans (5 %), ceux qui n'ont jamais été en union et n'ont jamais eu de rapports sexuels (5 %), ceux vivant à Byumba et Cyangugu (respectivement, 4 % et 3 %) et chez les hommes sans instruction (4 %).

La connaissance de trois moyens spécifiques d'éviter la transmission du VIH/Sida, à savoir l'utilisation du condom, l'abstinence sexuelle et le fait d'avoir un seul partenaire sexuel, est considérée comme essentielle d'un point de vue programmatique. Aussi, après avoir demandé aux enquêtés de citer les moyens d'éviter la transmission du VIH qu'ils connaissaient, on leur a demandé spécifiquement s'ils pensaient qu'il était possible d'éviter le Sida en s'abstenant de rapports sexuels, en utilisant des condoms au cours de chaque rapport sexuel et en n'ayant qu'un seul partenaire qui n'a aucun autre partenaire.

La majorité des femmes (tableau 1.3.1) sont bien informées (84 % connaissent deux moyens ou plus) et le pourcentage dépasse 78 % quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques. En particulier, 79 % des femmes ont évoqué le fait d'avoir un seul partenaire sexuel et 70 % l'utilisation du condom. Seulement une femme sur vingt (5 %) connaît le VIH/Sida mais ne connaît aucun des moyens corrects de l'éviter. Ces femmes qui ont des informations incomplètes sur VIH/Sida sont surtout celles de 15-19 ans (8 %), celles qui n'ont jamais été en union et qui n'ont jamais eu de rapports sexuels (8 %), celles du milieu rural (5 %), celles vivant dans la préfecture d'Umutara (9 %) et celles sans instruction (8 %).

Comme les femmes, la majorité des hommes (tableau 1.3.2) connaissent, au moins, deux moyens corrects pour éviter de contracter le VIH (92 %) et leur pourcentage dépasse largement 80 % quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques. En particulier, 86 % des hommes ont cité l'utilisation du condom et 83 % le fait d'avoir un seul partenaire sexuel. Seulement 2 % des hommes ont admis connaître le VIH/Sida mais pas de moyen important de l'éviter. Ces hommes se retrouvent surtout chez les 15-19 ans (5 %), ceux qui n'ont jamais été en union et qui n'ont jamais eu de rapports sexuels (5 %) et ceux sans instruction (4 %).

Tableau 1.3.1 Connaissance des femmes de moyens spécifiques d'éviter de contracter le VIH/Sida

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes selon leur connaissance de moyens corrects (d'un point de vue programmatique) d'éviter de contracter le VIH/Sida, et pourcentage de femmes qui connaissent certains moyens spécifiques d'éviter de contracter le VIH/Sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Ne connaît pas le VIH/Sida	Connaît le VIH/Sida mais ne connaît aucun moyen correct pour l'éviter	Nombre de moyens corrects connus		Total <sup>2</sup>	Pourcentage connaissant certains moyens spécifiques		Effectif
			Un	Deux ou plus		Utilisation du condom	Avoir un seul partenaire	
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	0,8	8,4	12,5	78,3	100,0	63,3	70,3	2 617
20-24	0,1	3,4	9,6	86,9	100,0	75,5	80,5	1 907
25-29	0,2	3,9	7,7	88,2	100,0	74,7	83,1	1 592
30-34	0,1	3,6	9,1	87,2	100,0	74,6	82,5	1 273
35-39	0,1	3,9	10,4	85,6	100,0	68,1	84,3	1 202
40-44	0,3	3,2	11,1	85,5	100,0	69,2	83,3	1 058
45-49	0,5	5,0	12,9	81,3	100,0	59,8	81,9	772
<b>État matrimonial</b>								
Jamais en union et n'ayant jamais eu rapports sexuels	0,7	7,6	13,3	78,4	100,0	63,7	69,5	3 059
Jamais en union ayant des rapports sexuels	0,7	2,3	6,4	90,6	100,0	82,9	75,9	490
En union	0,1	3,9	9,1	86,8	100,0	72,0	86,1	5 052
Divorcée/Séparée/Veuve	0,2	3,8	10,8	85,2	100,0	69,1	78,5	1 820
<b>Milieu de résidence</b>								
Kigali Ville/PVK	0,1	3,0	7,8	89,1	100,0	83,3	78,8	553
Autres villes	0,0	2,0	9,0	89,0	100,0	82,5	81,4	1 243
Total urbain	0,0	2,3	8,6	89,0	100,0	82,8	80,6	1 796
Rural	0,4	5,4	10,9	83,3	100,0	66,8	79,2	8 625
<b>Préfecture</b>								
Butare	0,4	3,4	9,4	86,9	100,0	72,6	79,2	922
Byumba	0,8	4,9	10,1	84,2	100,0	71,0	80,1	878
Cyangugu	0,1	3,9	7,8	88,2	100,0	72,6	84,0	782
Gikongoro	0,6	4,8	9,1	85,5	100,0	64,8	80,8	618
Cisenyi	0,0	5,2	10,3	84,4	100,0	65,0	82,4	1 163
Citarama	0,1	4,3	10,3	85,3	100,0	75,3	80,6	1 137
Kibungo	0,2	5,3	10,6	83,9	100,0	73,2	78,1	890
Kibuye	1,0	4,7	16,3	78,0	100,0	55,5	77,8	561
Kigali Ville (PVK)	0,1	3,0	7,8	89,1	100,0	83,3	78,8	553
Kigali Rural	0,3	4,9	12,7	82,1	100,0	71,4	72,4	1 434
Ruhengeri	0,5	6,8	9,6	83,1	100,0	61,9	81,7	1 140
Umutara	0,4	8,6	12,7	78,2	100,0	65,1	80,3	345
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun	0,8	7,7	12,9	78,6	100,0	58,0	78,0	2 549
Primaire/Alphabétisation	0,2	4,6	10,3	85,0	100,0	70,9	79,2	6 763
Secondaire ou plus	0,0	0,6	6,5	92,9	100,0	88,2	83,9	1 109
Ensemble	0,3	4,9	10,5	84,2	100,0	69,6	79,4	10 421

<sup>1</sup> Les moyens, considérés corrects d'un point de vue programmatique pour les femmes, comprennent : l'utilisation du condom, avoir un seul partenaire sexuel et s'abstenir de rapports sexuels.

<sup>2</sup> Y compris les non déterminés

Tableau 1.3.2 Connaissance des hommes de moyens spécifiques d'éviter de contracter le VIH/Sida

Répartition (en %) de l'ensemble des hommes selon leur connaissance de moyens corrects (d'un point de vue programmatique) d'éviter de contracter le VIH/Sida, et pourcentage d'hommes qui connaissent certains moyens spécifiques d'éviter de contracter le VIH/Sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Ne connaît pas le VIH/Sida	Connait le VIH/Sida mais ne connaît aucun moyen correct pour l'éviter	Nombre de moyens corrects connus <sup>1</sup>		Total <sup>2</sup>	Pourcentage connaissant certains moyens spécifiques		Effectif
			Un	Deux ou plus		Utilisation du condom	Avoir un seul partenaire	
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	0,6	4,8	9,8	84,8	100,0	81,9	73,1	762
20-24	0,0	1,4	4,3	94,3	100,0	87,1	81,6	433
25-29	0,6	0,3	3,3	95,8	100,0	90,3	87,7	359
30-34	0,0	0,4	4,5	95,1	100,0	93,0	88,8	269
35-39	0,0	1,3	3,0	95,6	100,0	87,6	89,1	262
40-44	0,8	1,3	4,1	93,9	100,0	85,2	86,8	273
45-49	0,0	1,6	6,3	92,1	100,0	86,2	86,1	175
50-54	0,0	1,0	6,2	92,8	100,0	86,1	88,8	126
55-59	0,0	3,6	6,3	90,1	100,0	88,3	83,7	60
<b>État matrimonial</b>								
Jamais en union et n'ayant jamais eu rapports sexuels	0,6	5,1	9,3	85,0	100,0	80,7	73,2	783
Jamais en union ayant des rapports sexuels	0,0	0,4	5,5	94,1	100,0	92,9	78,4	440
En union	0,3	1,1	4,2	94,4	100,0	87,1	88,8	1 416
Divorcé/Séparé/Veuf	0,0	0,0	3,1	96,9	100,0	94,6	88,8	78
<b>Milieu de résidence</b>								
Kigali Ville/PVK	0,0	1,3	3,2	95,2	100,0	91,6	77,2	186
Autres villes	0,0	1,0	2,0	96,9	100,0	91,9	82,8	350
Total urbain	0,0	1,1	2,5	96,3	100,0	91,8	80,9	537
Rural	0,4	2,1	4,0	93,5	100,0	85,1	83,1	2 180
<b>Préfecture</b>								
Butare	0,0	2,7	5,1	92,2	100,0	85,6	79,5	222
Byumba	0,0	5,2	7,5	87,3	100,0	84,5	75,6	255
Cyangugu	0,0	3,6	4,4	91,9	100,0	84,3	80,6	241
Gikongoro	0,0	2,1	7,4	90,5	100,0	80,0	83,2	171
Gisenyi	0,7	1,4	3,4	94,6	100,0	88,4	86,4	291
Gitarama	1,0	1,0	4,9	93,2	100,0	90,8	88,3	266
Kibungo	0,0	1,8	6,8	91,4	100,0	87,4	80,2	236
Kibuye	0,5	1,1	7,0	91,4	100,0	81,1	85,9	148
Kigali Ville (PVK)	0,0	1,3	6,1	92,4	100,0	91,6	77,2	186
Kigali Rural	0,0	2,0	8,8	89,2	100,0	84,7	77,1	347
Ruhengeri	1,0	1,5	3,0	94,4	100,0	89,3	90,9	278
Umutara	1,0	0,0	6,8	92,2	100,0	85,4	96,1	74
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun	1,0	3,9	6,5	88,7	100,0	79,5	84,0	473
Primaire/Alphabétisation	0,2	2,1	6,4	91,3	100,0	86,4	82,1	1 857
Secondaire ou plus	0,0	0,3	2,5	97,2	100,0	95,0	83,4	387
Ensemble	0,3	2,1	5,8	91,7	100,0	86,4	82,6	2 717

<sup>1</sup> Les moyens, considérés corrects d'un point de vue programmatique pour les hommes, comprennent : l'utilisation du condom, avoir une seule partenaire sexuelle et s'abstenir de rapports sexuels.

<sup>2</sup> Y compris les non-déterminés

## 1.2 CONNAISSANCE DE CERTAINS MODES DE TRANSMISSION DU VIH/SIDA

Le sida est une infection dont certains modes de transmission sont parfois mal connus de la population, comme la transmission de la mère à l'enfant. Par ailleurs, certaines personnes pensent qu'une personne atteinte du Sida présente nécessairement des signes visibles de la maladie.

Il apparaît au tableau 1.4.1 que 68 % des femmes pensent qu'une personne apparemment en bonne santé peut avoir le VIH/Sida, alors qu'une femme sur cinq pense le contraire et que 12 % des femmes ont déclaré ne pas savoir. Ce sont les femmes les plus jeunes (58 % à 15-19 ans), celles qui n'ont jamais été en union et qui n'ont jamais eu de rapports sexuels (62 %), celles du milieu rural (64 %), celles de Ruhengeri (58 %) et celles sans instruction (57 %) qui sont, proportionnellement, les moins nombreuses à savoir qu'une personne apparemment en bonne santé peut néanmoins avoir le sida.

La transmission du VIH/Sida de la mère à l'enfant (transmission verticale) est connue par une proportion importante de femmes (82 %), alors que 18 % des femmes sont mal informées, soit parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas de transmission verticale (7 %), soit parce qu'elles ne savent pas (12 %). Ces proportions de femmes mal informées sont particulièrement élevées à 15-19 ans (29 %), en milieu rural (20 %) et chez les femmes sans instruction (26 %). De façon spécifique, c'est la transmission durant la grossesse qui est la mieux connue (75 %). La transmission pendant l'accouchement et celle au cours de l'allaitement sont également assez bien connues (respectivement 68 % et 67 %).

Par ailleurs, environ deux tiers des femmes (62 %) ont déclaré qu'elles connaissaient une personne ayant le VIH/Sida ou morte de la maladie. Cette proportion est particulièrement élevée à Kigali Ville (87 %), dans les Autres Villes (80 %) et dans la préfecture d'Umutara (70 %).

La majorité des hommes (75 %) savent qu'une personne apparemment en bonne santé peut être infecté par le VIH/Sida (tableau 1.4.2). Cette notion est mieux connue par les hommes du milieu urbain (90 %), ceux de Kigali Ville (90 %) et Gitarama (81 %) et par ceux ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus (95 %).

La transmission du VIH/Sida de la mère à l'enfant (transmission verticale) est connue par une proportion importante d'hommes (87 %, contre 82 % des femmes), alors que 13 % des hommes sont mal informés, soit parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de transmission verticale (4 %, contre 7 % des femmes), soit parce qu'ils ne savent pas (9 % contre 12 % des femmes). Ces proportions d'hommes mal informés sont particulièrement élevées à 15-19 ans (24 %) et chez les hommes sans instruction (20 %). De façon spécifique, c'est la transmission durant la grossesse qui est la mieux connue (80 % contre 75 % chez les femmes). La transmission pendant l'accouchement et celle au cours de l'allaitement sont également assez bien connues (respectivement 70 % et 64 %).

La proportion d'hommes qui connaissaient une personne ayant le VIH/Sida ou qui en est morte, est un peu plus élevée que pour les femmes (72 % contre 62 %). Il faut signaler que ce sont les hommes du milieu urbain (87 %), en particulier ceux de la ville de Kigali (89 %) ainsi que ceux d'Umutara (84 %) qui connaissent le plus fréquemment une personne vivant avec le VIH/Sida ou morte de cette maladie.

**Tableau 1.4.1 Perception des femmes du VIH/Sida**

Répartition (en %) des femmes selon leur opinion sur l'apparence des personnes vivant avec le VIH/Sida et selon leur connaissance de la transmission du VIH/Sida mère/enfant, pourcentage connaissant quelqu'un ayant le VIH/sida ou mort du VIH/sida, par certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Personne qui paraît en bonne santé peut avoir le sida			Pourcentage qui pense que le VIH/Sida ne peut être transmis de la mère à l'enfant	Pourcentage qui pense que le VIH/Sida peut être transmis de la mère à l'enfant			Pourcentage qui ne connaissent pas le VIH/Sida ou ne savent pas s'il peut être transmis de la mère à l'enfant	Pourcentage connaissant une personne qui a le VIH/Sida, ou morte de VIH/Sida	Effectif de femmes
	Non	Oui	ND <sup>1</sup>		Pendant la grossesse	Pendant l'accouchement	A l'allaitement			
<b>Groupe d'âges</b>										
15-19	58,2	26,9	14,9	9,1	64,3	57,1	57,6	19,5	52,5	2 617
20-24	71,2	18,8	10,0	6,8	75,9	69,7	67,2	8,6	62,6	1 907
25-29	72,4	17,7	9,8	4,9	77,7	74,1	71,7	8,2	66,9	1 592
30-34	76,6	14,0	9,4	4,5	80,6	73,2	70,5	8,0	68,3	1 273
35-39	71,1	17,2	11,7	5,5	77,9	70,1	71,3	10,3	65,8	1 202
40-45	69,2	17,5	13,3	6,3	81,3	71,1	71,0	8,9	63,9	1 058
45-49	64,2	18,9	16,9	5,9	75,3	66,6	63,5	14,1	62,5	772
<b>État matrimonial</b>										
Jamais en union et n'ayant jamais eu rapports sexuels	61,6	24,5	13,9	8,0	65,7	59,4	58,2	18,2	53,9	3 059
Jamais en union ayant des rapports sexuels	77,5	16,2	6,3	7,4	71,6	68,7	67,2	11,4	68,6	490
En union	69,9	18,3	11,7	6,0	78,6	71,2	70,4	8,6	64,1	5 052
Divorcée/Séparée/Veuve	71,1	16,9	12,0	5,4	79,0	71,2	69,2	10,1	67,4	1 820
<b>Milieu de résidence</b>										
Kigali Ville/PVK	89,3	7,0	3,8	3,6	70,7	78,5	68,4	5,5	87,1	553
Autres villes	84,3	10,2	5,5	3,4	75,2	78,4	70,0	7,7	79,9	1 243
Total urbain	85,9	9,2	5,0	3,5	73,8	78,4	69,5	7,0	82,1	1 796
Rural	64,3	22,0	13,7	7,2	74,7	65,3	65,8	12,9	57,7	8 625
<b>Préfecture</b>										
Butare	68,3	21,4	10,3	4,8	78,9	71,0	71,9	10,1	61,8	922
Byumba	60,1	25,5	14,4	9,3	71,4	61,6	65,1	13,7	56,9	878
Cyangugu	72,6	20,3	7,2	8,0	78,3	69,5	71,5	7,9	68,0	782
Gikongoro	62,5	25,1	12,4	7,5	81,2	69,1	70,7	8,7	52,4	618
Gisenyi	61,6	24,3	14,2	9,0	71,7	64,7	65,1	13,0	56,8	1 163
Citarama	74,7	16,9	8,4	4,8	80,3	74,9	70,1	8,8	69,5	1 137
Kibungo	71,2	18,1	10,7	3,9	75,7	68,4	66,0	12,3	63,3	890
Kibuye	59,3	21,6	19,1	10,4	71,9	60,9	64,7	15,5	48,8	561
Kigali Ville (PVK)	89,3	7,0	3,8	3,6	70,7	78,5	68,4	5,5	87,1	553
Kigali Rural	74,6	13,9	11,5	4,0	70,9	67,0	62,7	12,9	64,6	1 434
Ruhengeri	57,9	21,9	20,2	8,7	71,0	60,1	60,1	17,8	51,8	1 140
Umutara	65,9	23,8	10,3	5,5	76,2	71,5	66,9	11,1	70,0	345
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucun	56,7	23,5	19,8	8,7	70,1	59,4	62,2	17,3	52,2	2 549
Primaire/Alphabétisation	68,3	20,7	11,0	6,4	76,5	67,5	67,5	11,4	61,5	6 763
Secondaire ou plus	92,5	5,6	1,9	2,5	72,8	87,1	70,5	2,2	86,5	1 109
Ensemble des femmes	68,1	19,8	12,2	6,5	74,6	67,6	66,5	11,8	61,9	10 421

<sup>1</sup> Comprend les femmes qui ne connaissent pas le VIH/Sida

Tableau 1.4.2 Perception des hommes du VIH/Sida

Répartition (en %) des hommes selon leur opinion sur l'apparence des personnes vivant avec le VIH/Sida et selon leur connaissance de la transmission du VIH/Sida mère/enfant, et pourcentage connaissant quelqu'un ayant le VIH/Sida ou mort du VIH/Sida, par certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Personne qui paraît en bonne santé peut avoir le sida			Pourcentage qui pense que le VIH/Sida ne peut être transmis de la mère à l'enfant	Pourcentage qui pense que le VIH/Sida peut être transmis de la mère à l'enfant			Pourcentage qui ne connaissent pas le VIH/Sida ou ne savent pas s'il peut être transmis de la mère à l'enfant	Pourcentage connaissant une personne qui a le VIH/Sida, ou morte de VIH/Sida	Effectif d'hommes
	Non	Oui	ND <sup>1</sup>		Pendant la grossesse	Pendant l'accouchement	A l'allaitement			
<b>Groupe d'âges</b>										
15-19	62,0	23,8	14,2	5,8	70,5	55,2	53,7	17,7	57,4	762
20-24	81,1	11,1	7,8	3,3	77,0	70,8	64,3	7,2	73,8	433
25-29	85,9	9,5	4,5	1,6	83,0	78,6	68,9	5,4	80,9	359
30-34	84,1	10,5	5,4	2,9	85,8	77,9	69,0	2,8	78,1	269
35-39	83,1	9,6	7,3	5,0	85,2	74,8	65,3	3,9	80,1	262
40-45	76,5	14,1	9,4	2,7	85,3	77,1	68,5	4,9	78,5	273
45-49	73,9	17,5	8,7	2,0	84,6	75,6	67,1	6,2	78,0	175
50-54	73,6	17,0	9,4	4,0	85,5	76,6	75,7	5,6	81,3	126
55-59	67,1	19,3	13,6	7,2	81,2	64,6	64,3	8,9	74,4	60
<b>État matrimonial</b>										
Jamais en union et n'ayant jamais eu rapports sexuels	63,0	21,4	15,5	6,2	69,4	56,4	52,1	17,8	56,8	783
Jamais en union ayant des rapports sexuels	83,6	12,6	3,8	2,0	80,2	72,5	66,5	5,6	82,5	440
En union	79,9	12,8	7,3	3,1	84,7	75,8	69,4	5,1	77,1	1 416
Divorcé/Séparé/Veuf	67,5	18,0	14,5	5,0	80,8	73,5	59,2	5,6	80,8	78
<b>Milieu de résidence</b>										
Kigali Ville/PVK	90,1	7,0	2,9	3,6	72,4	74,3	64,6	4,8	88,6	186
Autres villes	89,3	8,5	2,3	1,4	82,2	79,8	68,4	3,3	86,2	350
Total urbain	89,6	8,0	2,5	2,2	78,8	77,9	67,1	3,8	87,1	537
Rural	71,8	17,2	11,0	4,3	79,6	67,5	62,8	10,1	68,6	2 180
<b>Préfecture</b>										
Butare	77,4	15,1	7,5	2,7	82,2	70,1	66,3	8,4	70,8	222
Byumba	71,4	17,8	10,8	5,2	79,3	69,5	68,5	10,8	71,4	255
Cyangugu	70,6	15,7	13,7	4,4	78,6	69,4	58,1	10,5	67,3	241
Gikongoro	73,2	18,4	8,4	1,1	86,3	78,4	74,2	6,8	66,3	171
Gisenyi	78,2	14,3	7,5	4,8	84,4	72,1	65,3	6,1	74,8	291
Citarama	81,1	11,2	7,8	4,4	80,1	71,8	58,7	7,8	78,2	266
Kibungo	76,6	14,9	8,6	6,8	70,3	63,5	59,5	8,6	68,0	236
Kibuye	64,9	23,2	11,9	3,8	78,9	65,9	66,5	11,4	69,2	148
Kigali Ville (PVK)	90,1	7,0	2,9	3,6	72,4	74,3	64,6	4,8	88,6	186
Kigali Rural	75,1	15,3	9,6	2,8	74,7	66,7	61,8	10,8	68,3	347
Ruhengeri	70,6	16,2	13,2	2,5	85,8	66,5	62,4	11,2	70,1	278
Umutara	68,9	24,3	6,8	3,9	83,5	70,9	61,2	4,9	83,5	74
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucun	60,3	20,6	19,2	5,1	74,4	62,3	58,4	15,2	63,4	473
Primaire/Alphabétisation	75,0	16,5	8,5	4,0	80,8	67,8	64,1	8,8	70,7	1 857
Secondaire ou plus	95,3	3,7	1,0	1,6	79,3	87,4	67,6	1,0	90,3	387
Ensemble des femmes	75,3	15,4	9,3	3,9	79,5	69,6	63,6	8,8	72,3	2 717

<sup>1</sup> Comprend les hommes qui ne connaissent pas le VIH/Sida

### 1.3 ASPECT SOCIAL DE LA PRÉVENTION/PRISE EN CHARGE DU VIH/SIDA

Sous l'expression « aspect social de la prévention et de la prise en charge du VIH/Sida », ont été regroupés différents sujets, à savoir :

- la discussion par les femmes et les hommes en union, des moyens d'éviter de contracter le VIH/Sida avec le conjoint ou partenaire;
- la confidentialité concernant la séropositivité;
- la prise en charge des malades par les proches;
- l'autorisation de travailler pour des personnes séropositives;
- l'éducation des enfants de 12-14 ans sur l'utilisation du condom; et
- la discussion du VIH/Sida dans les médias.

Deux tiers des femmes en union (66 %) ont déclaré qu'elles avaient discuté des moyens préventifs du VIH/Sida avec leurs conjoints ou partenaires (tableau 1.5); à l'opposé, un tiers n'en avaient pas discuté. Les femmes en union qui ont le plus fréquemment discuté sont celles du milieu urbain (77 %), en particulier celles de la ville de Kigali (79 %), les femmes de la préfecture d'Umutara (73 %) et de Cyangugu (72 %). De plus, on constate que le pourcentage de femmes en union qui ont discuté avec leur partenaire, augmente avec le niveau d'instruction atteint par la femme, de 55 % pour les femmes sans instruction à 86 % pour celles de niveau secondaire ou plus.

Un très faible pourcentage de femmes interviewées (14 %) estiment qu'une personne ayant le VIH/Sida devrait pouvoir garder son état secret. Cette très faible proportion de femmes favorables à la confidentialité de l'état de santé des malades est encore plus faible parmi les enquêtés de Kigali Ville (8 %), celles de Gitarama et d'Umutara (10 %) et celles de niveau secondaire (7 %).

À la question de savoir si, dans le cas où quelqu'un de sa famille contractait le VIH/Sida, la femme serait prête à en prendre soin chez elle, la majorité ont répondu par l'affirmative (80 %). Cette attitude est particulièrement fréquente en milieu urbain (91 %), en particulier à Kigali Ville (92 %) et parmi les femmes de niveau d'instruction secondaire et plus (94 %).

À la question de savoir si une personne avec le VIH/Sida devrait pouvoir continuer à travailler avec d'autres personnes, deux femmes sur trois (65 %) ont répondu qu'elles étaient contre, alors que 35 % des femmes estiment qu'une personne avec le VIH/Sida devrait pouvoir continuer à travailler (tableau 1.6). Cette proportion varie d'un minimum de 31 % chez les femmes du milieu rural et de 26 % chez les femmes sans instruction à un maximum de 65 % à Kigali Ville et de 63 % chez les femmes de niveau secondaire ou plus.

Deux femmes sur trois (66 %) estiment que les enfants de 12-14 ans devraient être éduqués sur l'utilisation du condom. Cette opinion est surtout partagée par les femmes du milieu urbain (75 %) et celles de niveau d'instruction secondaire ou plus (78 %).

**Tableau 1.5 Opinion des femmes sur l'aspect social de la prévention/ prise en charge du VIH/Sida**

Répartition (en %) de femmes actuellement en union, et répartition (en %) des femmes, selon leur réponse à différentes questions relatives à l'aspect social de la prévention/prise en charge du VIH/Sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Discussion par les femmes des moyens d'éviter de contracter le VIH/Sida avec leur mari/partenaire			Effectif de femmes actuellement en union	Une personne avec le VIH/Sida devrait-elle pouvoir garder son état secret?			Si quelqu'un de votre famille contractait le VIH/Sida, seriez-vous prête à en prendre soin, chez vous?			Effectif des femmes
	Celles qui ont discuté	Celles qui n'ont pas discuté	NSP/ND		Oui	Non	NSP/ND	Oui	Non	NSP/Ça dépend/pas sûre	
<b>Groupe d'âges</b>											
15-19	62,5	37,0	0,5	172	15,0	80,5	4,5	72,4	20,5	7,1	2 617
20-24	68,1	31,8	0,1	963	13,3	83,8	2,9	82,3	13,0	4,7	1 907
25-29	72,2	27,2	0,5	1 120	11,7	85,5	2,7	83,9	12,2	3,9	1 592
30-34	68,0	31,8	0,1	902	11,0	87,3	1,7	84,8	10,9	4,3	1 273
35-39	62,4	36,9	0,8	811	16,3	81,0	2,7	80,4	16,0	3,6	1 202
40-44	62,6	36,5	0,9	649	15,8	82,3	1,9	79,9	15,8	4,2	1 058
45-49	55,8	42,8	1,5	435	18,4	77,6	4,0	78,1	17,4	4,5	772
<b>Milieu de résidence</b>											
Kigali Ville/PVK	79,4	20,5	0,2	206	7,7	89,4	2,9	92,1	3,7	4,2	553
Autres villes	75,7	24,3	0,0	535	11,1	86,4	2,5	90,4	5,3	4,2	1 243
Total urbain	76,7	23,2	0,0	741	10,0	87,3	2,6	90,9	4,8	4,2	1 796
Rural	64,3	35,1	0,6	4 311	15,1	81,8	3,2	77,2	17,7	5,1	8 625
<b>Préfecture</b>											
Butare	66,4	33,0	0,6	381	15,4	82,3	2,3	85,7	9,9	4,4	922
Byumba	66,9	32,4	0,7	508	16,3	80,2	3,5	74,4	20,5	5,1	878
Cyangugu	72,4	27,3	0,2	374	15,8	82,3	1,9	81,3	15,4	3,3	782
Gikongoro	61,9	37,3	0,8	323	12,1	85,8	2,1	76,2	19,1	4,7	618
Gisenyi	60,3	39,1	0,6	644	17,3	78,5	4,2	65,0	30,6	4,4	1 163
Gitarama	75,1	24,3	0,5	480	9,6	88,8	1,5	87,4	8,7	3,9	1 137
Kibungo	62,9	36,6	0,5	404	16,0	81,2	2,9	83,6	10,3	6,1	890
Kibuye	63,0	36,0	1,0	304	16,8	79,2	4,0	69,3	24,2	6,5	561
Kigali Ville (PVK)	79,4	20,5	0,2	206	7,7	89,4	2,9	92,1	3,7	4,2	553
Kigali Rural	64,6	34,6	0,8	641	11,6	84,2	4,2	87,3	7,3	5,5	1 434
Ruhengeri	61,8	38,2	0,0	609	18,1	78,5	3,4	71,6	22,2	6,2	1 140
Umutara	72,5	27,1	0,4	178	10,1	86,4	3,5	83,8	11,5	4,7	345
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucun	55,1	43,9	1,1	1 453	18,8	77,2	4,0	69,9	23,7	6,4	2 549
Primaire/Alphabétisation	68,1	31,5	0,3	3 087	13,7	83,5	2,9	80,9	14,4	4,7	6 763
Secondaire ou plus	85,5	14,3	0,2	512	6,8	90,8	2,4	93,9	3,2	2,9	1 109
<b>Ensemble</b>	66,1	33,3	0,5	5 052	14,2	82,7	3,1	79,6	15,5	4,9	10 421

Par ailleurs, quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques, la quasi-totalité des femmes ont déclaré qu'il était admissible de parler du sida dans les médias : 98 % à la radio, 97 % à la télévision et 97 % dans les journaux. Cette positive opinion est très répandue parmi les femmes quelle que soit la caractéristique socio-démographique.

En ce qui concerne la discussion des moyens de prévention du VIH/Sida avec leurs conjointes ou partenaires, les résultats du tableau 1.7 montrent qu'une proportion importante d'hommes en union (77 %, contre 66 % de femmes) ont déclaré en avoir discuté, contre 22 % qui

**Tableau 1.6 Opinion des femmes sur l'aspect social de la prévention et de la réduction du VIH/Sida**

Répartition (en %) des femmes selon leur réponse à différentes autres questions relatives à l'aspect social de la prévention et de la réduction du VIH/sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Pourcentage qui pense qu'une personne atteinte de VIH/Sida doit pouvoir continuer à travailler	Les enfants de 12 à 14 ans devraient-ils être éduqués sur l'utilisation du condom?			Pourcentage qui ont déclaré admissible de parler du sida dans les médias			Effectif des femmes
		Oui	Non	NSP/ND	Radio	TV	Journaux	
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	29,9	66,0	25,5	8,5	96,6	95,3	95,9	2 617
20-24	38,1	71,6	22,5	5,9	98,8	97,9	98,0	1 907
25-29	39,8	73,6	21,8	4,5	98,3	97,4	97,5	1 592
30-34	38,2	67,9	26,4	5,7	99,2	98,2	98,5	1 273
35-39	33,8	63,6	29,6	6,8	98,1	97,1	96,7	1 202
40-44	34,0	58,8	32,8	8,3	98,9	97,2	97,4	1 058
45-49	32,4	52,1	38,2	9,7	97,6	97,1	97,1	772
<b>État matrimonial</b>								
Jamais en union et n'ayant jamais eu rapports sexuels	32,7	66,1	25,8	8,1	97,2	96,1	96,6	3 059
Jamais en union ayant des rapports sexuels	41,0	73,9	19,7	6,4	97,7	95,6	96,4	490
En union	36,0	66,8	26,7	6,5	98,6	97,5	97,6	5 052
Divorcée/Séparée/Veuve	34,2	63,6	29,8	6,6	98,2	97,5	97,4	1 820
<b>Milieu de résidence</b>								
Kigali Ville/PVK	64,9	76,0	20,0	4,0	98,6	97,9	97,8	553
Autres villes	52,7	73,8	21,8	4,4	99,2	98,2	98,6	1 243
Total urbain	56,5	74,5	21,3	4,3	99,0	98,1	98,4	1 796
Rural	30,5	64,7	27,8	7,5	97,9	96,7	96,9	8 625
<b>Préfecture</b>								
Butare	33,4	68,7	26,8	4,5	98,4	97,6	98,0	922
Byumba	29,0	67,1	25,3	7,5	97,2	96,0	96,1	878
Cyangugu	34,7	71,0	26,1	2,8	98,4	97,2	97,3	782
Gikongoro	29,9	67,1	27,6	5,3	97,3	96,4	96,7	618
Cisenyi	28,5	63,8	28,2	8,0	97,7	96,1	96,3	1 163
Gitarama	39,9	69,8	25,9	4,3	98,7	97,8	98,2	1 137
Kibungo	28,5	70,1	21,9	7,9	98,7	98,3	98,6	890
Kibuye	22,9	58,2	32,5	9,3	97,4	96,4	96,5	561
Kigali Ville (PVK)	64,9	76,0	20,0	4,0	98,6	97,9	97,8	553
Kigali Rural	40,8	63,7	26,6	9,7	97,5	95,8	96,0	1 434
Ruhengeri	35,0	60,0	29,7	10,3	98,5	97,4	97,3	1 140
Umutara	33,9	64,3	30,0	5,7	99,2	98,6	98,8	345
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun	26,3	59,2	30,8	10,0	97,2	96,4	96,5	2 549
Primaire/Alphabétisation	33,7	67,2	26,3	6,5	98,1	96,9	97,1	6 763
Secondaire ou plus	62,8	77,5	19,4	3,0	99,7	98,8	99,2	1 109
Ensemble	35,0	66,4	26,7	7,0	98,1	97,0	97,2	10 421

n'en ont jamais parlé. Comme pour les femmes en union, les hommes ayant déclaré avoir discuté le plus fréquemment avec leurs conjointes ou partenaires sont ceux du milieu urbain (88 %) et ceux de niveau secondaire ou plus (89 %).

Comme chez les femmes, un très faible pourcentage d'hommes (13 %) pensent qu'une personne ayant le VIH/Sida devrait être autorisée à garder son état secret (tableau 1.7). Comme chez les femmes, cette très faible proportion d'hommes favorables à la confidentialité de l'état de santé des malades est encore plus faible à Kigali Ville (6 %), à Butare (9 %) et Umutara (9 %) et parmi les hommes de niveau secondaire (7 %).

**Tableau 1.7 Opinion des hommes sur l'aspect social de la prévention/prise en charge du VIH/Sida**

Répartition (en %) d'hommes actuellement en union, et répartition (en %) des hommes selon leur réponse à différentes questions relatives à l'aspect social de la prévention/prise en charge du VIH/Sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Discussion par les hommes des moyens d'éviter de contracter le VIH/Sida avec leur épouse/partenaire			Effectif d'hommes actuellement en union	Une personne avec le VIH/Sida devrait-elle pouvoir garder son état secret?			Si quelqu'un de votre famille contractait le VIH/Sida, seriez-vous prêt à en prendre soin, chez vous?			Effectif des hommes
	Ceux qui ont discuté	Ceux qui n'ont pas discuté	NSP/ND		Oui	Non	NSP/ND	Oui	Non	NSP/Ca dépend/pas sûr	
<b>Groupe d'âges</b>											
15-19	51,3	48,7	0,0	11	19,9	76,9	3,2	78,4	17,6	4,0	762
20-24	63,9	36,1	0,0	122	11,3	87,4	1,3	89,3	8,8	2,0	433
25-29	76,1	23,1	0,9	228	9,4	88,8	1,8	92,8	4,0	3,2	359
30-34	84,7	15,3	0,0	235	6,6	93,2	0,1	93,8	5,4	0,8	269
35-39	83,1	16,7	0,1	242	9,5	90,0	0,5	91,1	8,1	0,8	262
40-44	80,3	18,5	1,2	247	13,3	82,8	3,9	92,6	5,2	2,2	273
45-49	76,9	23,1	0,0	166	8,1	90,3	1,6	91,1	5,5	3,4	175
50-54	67,0	33,0	0,0	115	10,5	87,4	2,0	88,3	9,5	2,2	126
55-59	70,2	29,8	0,0	52	20,2	78,2	1,6	86,9	9,6	3,5	60
<b>Milieu de résidence</b>											
Kigali Ville/PVK	87,4	12,1	0,5	73	5,9	91,6	2,5	94,5	4,2	1,3	186
Autres villes	87,9	11,6	0,4	163	11,2	88,4	0,4	96,4	2,1	1,5	350
Total urbain	87,8	11,8	0,5	237	9,3	89,5	1,1	95,7	2,8	1,4	537
Rural	75,3	24,4	0,3	1 179	13,9	83,9	2,3	85,7	11,4	2,9	2 180
<b>Préfecture</b>											
Butare	77,4	22,6	0,0	96	8,6	90,3	1,2	89,7	9,7	0,6	222
Byumba	89,8	10,2	0,0	141	13,6	84,5	1,9	85,4	13,6	0,9	255
Cyangugu	74,4	25,6	0,0	121	12,1	85,5	2,4	87,9	10,1	2,0	241
Gikongoro	81,8	18,2	0,0	99	8,9	88,9	2,1	84,7	15,3	0,0	171
Gisenyi	68,5	30,3	1,1	176	13,6	84,4	2,0	88,4	8,2	3,4	291
Gitarama	82,2	17,8	0,0	138	15,0	83,5	1,5	90,3	7,3	2,4	266
Kibungo	81,3	18,7	0,0	97	17,6	79,7	2,7	88,7	9,9	1,4	236
Kibuye	82,5	17,5	0,0	91	16,2	82,2	1,6	85,9	10,3	3,8	148
Kigali Ville (PVK)	87,4	12,1	0,5	73	5,9	91,6	2,5	94,5	4,2	1,3	186
Kigali Rural	70,8	29,2	0,0	167	13,7	84,3	2,0	85,1	10,4	4,4	347
Ruhengeri	71,4	27,7	0,8	168	15,7	81,7	2,5	83,2	10,2	6,6	278
Umutara	67,7	29,2	3,1	47	8,7	89,3	1,9	94,2	3,9	1,9	74
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucun	70,0	29,0	1,0	327	20,7	75,2	4,1	80,3	14,2	5,5	473
Primaire/Alphabétisation	77,6	22,2	0,2	905	12,3	86,0	1,7	87,7	10,0	2,3	1 857
Secondaire ou plus	89,4	10,4	0,2	184	6,9	92,1	1,1	96,4	2,7	0,9	387
Ensemble	77,4	22,3	0,4	1 416	13,0	85,0	2,0	87,7	9,7	2,6	2 717

La majorité des hommes (88 %, contre 80 % des femmes) seraient prêts à prendre soin de quelqu'un de leur famille atteint du VIH/Sida. Cette attitude est très répandue, quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques, même si elle est moins fréquente chez les hommes sans instruction (80 %) que chez les autres.

Par ailleurs, près de la moitié de l'ensemble des hommes (48 %, contre 35 % chez les femmes) estiment qu'une personne ayant le VIH/Sida devrait pouvoir continuer à travailler avec d'autres personnes (tableau 1.8). Cette opinion est surtout partagée par les hommes les plus instruits (78 %) et ceux du milieu urbain (69 %).

Sept hommes sur dix (70 %, contre 66 % de femmes) estiment que les enfants de 12-14 ans devraient être éduqués sur l'utilisation du condom. Cette opinion est plus particulièrement partagée par les hommes du milieu urbain (77 %) et ceux de niveau d'instruction secondaire ou plus (78 %).

**Tableau 1.8 Opinion des hommes sur l'aspect social de la prévention et de la réduction du VIH/Sida**

Répartition (en %) des hommes selon leur réponse à différentes autres questions relatives à l'aspect social de la prévention et de la réduction du VIH/sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Pourcentage qui pense qu'une personne atteinte de VIH/Sida doit pouvoir continuer à travailler	Les enfants de 12 à 14 ans devraient-ils être éduqués sur l'utilisation du condom?			Pourcentage qui ont déclaré admissible de parler du sida dans les médias			Effectif des hommes
		Oui	Non	NSP/ND	Radio	TV	Journaux	
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	38,9	67,1	27,1	5,8	95,9	94,7	94,9	762
20-24	54,5	75,3	22,2	2,4	99,7	99,7	99,7	433
25-29	53,3	81,1	16,8	2,1	97,4	98,1	98,1	359
30-34	50,4	76,2	19,8	4,0	99,9	98,3	99,7	269
35-39	45,9	69,7	27,1	3,2	98,1	98,1	97,9	262
40-44	54,7	65,7	30,1	4,2	98,3	96,8	96,8	273
45-49	52,1	61,8	32,4	5,8	98,5	97,0	97,7	175
50-54	46,7	54,6	42,0	3,5	100,0	99,7	99,7	126
55-59	36,2	65,1	30,4	4,5	100,0	98,8	98,8	60
<b>État matrimonial</b>								
Jamais en union et n'ayant jamais eu rapports sexuels	40,7	66,9	27,3	5,8	95,9	95,1	95,2	783
Jamais en union ayant des rapports sexuels	56,7	81,5	17,3	1,3	98,9	98,2	98,7	440
En union	49,2	68,9	27,1	4,1	98,8	98,2	98,4	1 416
Divorcé/Séparé/veuf	44,3	67,0	30,4	2,5	99,1	99,1	99,1	78
<b>Milieu de résidence</b>								
Kigali Ville/PVK	69,6	79,1	18,3	2,7	99,4	99,0	98,1	186
Autres villes	68,2	76,4	22,8	0,8	99,2	97,9	98,4	350
Total urbain	68,7	77,3	21,2	1,4	99,3	98,3	98,3	537
Rural	42,7	68,6	26,7	4,7	97,7	97,1	97,3	2 180
<b>Préfecture</b>								
Butare	41,5	74,7	21,6	3,7	98,0	97,5	97,5	222
Byumba	41,8	72,8	24,9	2,3	98,6	98,1	98,6	255
Cyangugu	50,8	69,4	28,2	2,4	99,2	98,8	99,6	241
Gikongoro	37,4	74,7	20,0	5,3	97,4	97,4	97,4	171
Gisenyi	47,6	64,6	28,6	6,8	99,3	98,0	99,3	291
Citarama	49,0	65,5	31,1	3,4	95,6	95,6	95,6	266
Kibungo	41,9	75,7	20,7	3,6	97,3	97,3	96,8	236
Kibuye	47,0	70,8	27,0	2,2	98,9	98,4	98,9	148
Kigali Ville (PVK)	69,6	79,1	18,3	2,7	99,4	99,0	98,1	186
Kigali Rural	45,4	68,7	29,7	1,6	98,0	96,4	96,8	347
Ruhengeri	54,3	66,0	24,4	9,6	97,0	95,4	95,4	278
Umutara	51,5	64,1	31,1	4,9	98,1	97,1	97,1	74
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun	34,4	56,9	33,6	9,4	95,7	95,3	95,7	473
Primaire/Alphabétisation	44,9	72,2	24,5	3,3	98,2	97,4	97,5	1 857
Secondaire ou plus	78,2	77,5	21,2	1,3	99,8	99,4	99,8	387
Ensemble	47,8	70,3	25,6	4,1	98,0	97,3	97,5	2 717

Comme les femmes et quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques, la quasi-totalité des hommes ont déclaré qu'il était admissible de parler du sida dans les médias : 98 % à la radio, 97 % à la télévision et 98 % dans les journaux.

#### 1.4 TEST DU VIH/SIDA

Dans toute politique de dépistage volontaire du VIH/Sida, il est important de connaître l'opinion de la population sur la question. L'EDSR-II a été l'occasion d'estimer la proportion de la population qui s'était déjà faite testée et pour la sous-population non encore testée, la proportion qui désirait connaître son statut sérologique.



Une minorité de femmes (5 %) ont déclaré avoir été testées pour le VIH/Sida et ces tests ont surtout été effectués dans le secteur public (4 %) (tableau 1.9.1). Ce sont, plus particulièrement, les femmes de 20-35 ans, celles qui n'ont jamais été en union mais ont déjà eu des rapports sexuels (10 %), celles du milieu urbain (15 %), en particulier de Kigali Ville (23 %) et celles de niveau secondaire ou plus (20 %, contre 1 % pour celles sans instruction) qui sont les plus nombreuses à avoir effectué un test. À l'opposé, 95 % des femmes n'ont jamais effectué de test : 49 % désireraient connaître leur statut sérologique et 45 % non.

Parmi les femmes non testées, plus de la moitié (58 %) ne connaissaient pas d'endroit où effectuer le test, alors que 40 % ont déclaré connaître un endroit du secteur public et 1 % un endroit dans le secteur privé. Ainsi, une proportion importante de femmes qui souhaiteraient être testées ne sauraient pas où aller pour le test. Cette méconnaissance est particulièrement élevée en milieu rural (61 %, contre 41 % pour le milieu urbain), dans les préfectures de Ruhengeri (69 %), de Kibuye (67 %) et parmi les femmes sans instruction (71 %).

Un faible pourcentage d'hommes (7 %, contre 5 % des femmes) ont déclaré avoir été testés pour le VIH/Sida et ces tests, comme pour les femmes, ont surtout été effectués dans le secteur public (83 %) (tableau 1.9.2). Les hommes les plus nombreux à avoir effectué le test sont ceux du groupe d'âges 25-29 ans (15 %), ceux qui n'ont jamais été en union mais qui ont déjà eu des rapports sexuels (13 %) et ceux en union rompue (13 %), les hommes du milieu urbain (14 %), surtout ceux de la ville de Kigali (18 %) et les hommes de niveau d'instruction secondaire ou plus (18 %). À l'opposé, 93 % des hommes n'ont pas effectué de test : 60 % désireraient le faire et 32 % ne le souhaitent pas.

Parmi les hommes non testés, près de la moitié (49 %) ne connaissaient pas d'endroit où effectuer le test. Les hommes du milieu rural (55 %) et ceux sans instruction (69 %) sont ceux qui manquent le plus d'information à ce niveau.

Tableau 1.9.2. Test du VIH/Sida. (pour les hommes)

Répartition (en %) des hommes selon qu'ils ont été testés ou non, et selon le lieu du test pour ceux qui ont été testés, et selon le désir d'être testés pour ceux qui ne l'ont pas été et pourcentage d'hommes qui n'ont pas été testés selon leur connaissance d'un endroit pour le test, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Homme a été testé dans le secteur :				Homme n'a pas été testé et désire être testé				Parmi les hommes non testés connaissance d'un endroit pour se faire tester				Effectif d'hommes non testés				
	Public		Privé		Autre		Ensemble <sup>1</sup>		Public		Privé			Autre		Au moins un endroit	
	NSP <sup>2</sup>	Ensemble	Oui	Non	NSP <sup>2</sup>	Ensemble	Total	Effectif des hommes	Public	Privé	Autre	NSP <sup>2</sup>		Effectif d'hommes non testés			
<b>Groupe d'âges</b>																	
15-19	1,8	0,0	0,0	59,6	37,1	1,4	98,2	100,0	762	34,4	1,2	0,5	35,3	64,7	749		
20-24	7,6	1,2	0,8	65,9	24,4	0,0	90,4	100,0	433	59,2	5,9	0,9	64,4	35,6	391		
25-29	12,8	1,9	0,7	63,8	19,4	1,4	84,6	100,0	359	60,2	2,2	1,4	62,2	37,8	303		
30-34	5,5	1,5	0,0	70,1	22,2	0,6	93,0	100,0	269	54,5	5,2	0,7	56,8	43,2	250		
35-39	8,4	0,5	0,4	57,5	32,3	0,9	90,7	100,0	262	51,3	6,0	2,9	58,0	42,0	238		
40-44	6,5	0,7	0,0	56,6	34,3	1,7	92,7	100,0	273	48,3	2,5	0,7	50,0	50,0	253		
45-49	2,3	1,1	0,8	42,2	41,6	0,7	95,8	100,0	175	56,9	2,1	0,8	56,6	41,4	167		
50-54	4,7	0,2	0,3	49,4	44,5	0,9	94,8	100,0	126	43,4	2,2	0,0	44,7	55,3	119		
55-59	4,7	2,8	0,0	24,8	67,8	0,0	92,5	100,0	60	32,6	1,9	0,0	33,2	66,8	55		
<b>État matrimonial</b>																	
Jamais en union et n'ayant jamais eu rapports sexuels	1,8	0,2	0,3	57,8	38,6	1,3	97,7	100,0	783	38,2	1,8	0,6	39,8	60,2	765		
Jamais en union ayant des rapports sexuels	11,1	1,5	0,7	70,2	16,2	0,3	86,7	100,0	440	57,8	6,2	0,8	61,3	38,7	382		
En union	6,2	1,0	0,2	58,2	33,2	1,1	92,5	100,0	1 416	51,4	3,1	1,2	54,2	45,8	1 310		
Divorcé/Séparé/Veuf	11,0	1,8	0,0	59,7	27,1	0,5	87,2	100,0	78	45,8	2,2	0,0	45,8	54,2	68		
<b>Milieu de résidence</b>																	
Kigali Ville/PVK	14,6	3,0	0,8	55,9	24,5	1,1	81,6	100,0	186	65,7	21,0	2,3	75,8	24,2	152		
Autres villes	9,6	2,2	0,0	59,7	28,1	0,4	88,2	100,0	350	71,3	7,0	0,9	75,3	24,7	309		
Total urbain	11,3	2,5	0,3	58,4	26,9	0,6	85,9	100,0	537	69,5	11,6	1,4	75,5	24,5	461		
Rural	4,6	0,5	0,3	60,5	33,1	1,1	94,7	100,0	2 180	43,4	1,3	0,8	45,2	54,8	2 063		
<b>Préfecture</b>																	
Butare	6,6	3,7	0,5	61,0	28,2	0,0	89,2	100,0	222	51,3	4,9	0,6	55,6	44,4	198		
Byumba	8,9	0,5	0,0	60,1	30,5	0,0	90,6	100,0	255	49,2	2,1	0,0	51,3	48,7	231		
Cyangugu	5,6	0,4	1,2	58,5	34,3	0,0	92,7	100,0	241	55,2	1,3	1,3	57,4	42,6	223		
Citongoro	1,1	0,0	0,0	69,5	28,4	1,1	98,9	100,0	171	42,6	0,5	0,5	42,6	57,4	169		
Gisenyi	2,7	1,4	0,0	56,5	37,4	2,0	95,9	100,0	291	36,9	2,1	0,0	38,3	61,7	279		
Gitarama	5,8	1,0	0,0	68,8	38,8	1,9	93,2	100,0	266	43,2	1,6	0,5	44,3	55,7	248		
Kibungo	4,5	0,5	0,5	76,1	18,0	0,5	94,6	100,0	236	43,8	1,9	0,5	43,8	56,2	223		
Kibuye	2,2	0,0	0,0	60,5	35,1	2,2	97,8	100,0	148	47,0	0,6	0,0	47,5	52,5	145		
Kigali Ville (PVK)	14,6	3,0	0,8	55,9	24,5	1,1	81,6	100,0	186	65,7	21,0	2,3	75,8	24,2	152		
Kigali Rural	7,6	0,0	0,4	63,1	28,5	0,4	92,0	100,0	347	59,0	3,5	1,3	62,4	37,6	319		
Ruhengeri	5,6	0,0	0,0	51,3	41,1	2,0	94,4	100,0	278	43,5	0,5	2,7	46,8	53,2	263		
Umutara	1,0	0,0	1,0	60,2	36,9	1,0	98,1	100,0	74	37,6	3,0	1,0	41,6	58,4	73		
<b>Niveau d'instruction</b>																	
Aucun	3,0	0,3	0,2	50,9	43,1	2,4	96,4	100,0	473	29,3	1,1	1,5	31,3	68,7	456		
Primaire/Alphabétisation	5,1	0,5	0,2	62,6	30,9	0,8	94,3	100,0	1 857	47,5	2,2	0,5	49,4	50,6	1 751		
Secondaire ou plus	13,2	3,5	1,2	59,3	22,5	0,4	82,2	100,0	387	79,5	11,6	2,3	85,8	14,2	318		
Ensemble des hommes	5,9	0,9	0,3	60,1	31,8	1,0	92,9	100,0	2 717	48,2	3,2	0,9	50,7	49,3	2 525		

<sup>1</sup> Y compris les non-déterminés concernant le lieu du test.

<sup>2</sup> Comprend les hommes qui ne connaissent pas le VIH/Sida.

## 1.5 INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)

Dans la mesure où les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) favorisent la transmission du virus du Sida, la prévention et la lutte contre ces infections constituent une priorité en Afrique. Aussi, à l'EDSR-II, s'est-on intéressé à connaître le niveau de connaissance et de prévalence des IST au sein de la population rwandaise.

### *Connaissance des IST*

Une femme sur cinq (20 %) n'a jamais entendu parler d'IST (en dehors du VIH/Sida) (tableau 1.10.1). Ce manque de connaissance est particulièrement important parmi les jeunes de 15-19 ans (43 %), en milieu rural (22 %), parmi les femmes sans instruction (25 %) et parmi celles de niveau primaire (21 %).

Parmi les femmes qui ont entendu parler d'IST, un peu moins d'une sur deux ne connaît aucun signe ou symptôme de ces infections que ce soit chez les hommes (47 %) ou chez les femmes (45 %); à l'opposé, environ une femme sur quatre connaît un seul signe ou symptôme d'IST et un peu plus du quart des femmes connaissent deux symptômes ou plus, que ce soit chez les hommes ou les femmes. En ce qui concerne la connaissance de signes ou symptômes d'IST chez les hommes ou chez les femmes, les femmes en union ou en rupture d'union et celles de niveau secondaire sont légèrement mieux informées que les autres.

Par rapport aux femmes, une proportion relativement moins importante d'hommes (tableau 1.10.2) n'ont jamais entendu parler d'IST (14 % contre 20 %). Cette proportion est néanmoins particulièrement importante chez les hommes de 15-19 ans (32 %), chez en union et n'ayant jamais eu de rapports sexuels (32 %), chez ceux du milieu rural (15 %) et ceux n'ayant pas ou peu d'instruction (respectivement 16 % et 15 %).

Parmi les hommes qui ont entendu parler d'IST, plus de la moitié (57 %) ne connaissent aucun signe ou symptômes de ces infections chez les femmes alors que 26 % seulement ne connaissent aucun symptôme chez les hommes. Bien que la proportion d'hommes qui connaissent des symptômes d'IST chez les femmes soit toujours nettement plus faible que la proportion de ceux qui connaissent ces symptômes chez les hommes, on constate que ce sont toujours les hommes en rupture d'union et ceux de niveau secondaire ou plus qui sont les mieux informés.

Tableau 1.10.1 Connaissance des femmes des infections sexuellement transmissibles (IST)

Pourcentage de femmes n'ayant pas entendu parler d'IST (en dehors du Sida) et répartition (en %), de celles qui en ont entendu parler selon leur connaissance des signes ou symptômes d'IST chez l'homme et chez la femme, et selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Pourcentage n'a pas entendu parler d'IST	Effectif des femmes	Connaissance des femmes des signes et symptômes chez l'homme			Total	Connaissance des femmes des signes et symptômes chez la femme			Total	Effectif de femmes qui ont entendu parler d'IST
			Ne connaît aucun signe ou symptôme	Connaît un signe ou symptôme	Connaît 2+ signes ou symptômes		Ne connaît aucun signe ou symptôme	Connaît un signe ou symptôme	Connaît 2+ signes ou symptômes		
<b>Groupe d'âges</b>											
15-19	42,5	2 617	62,4	24,1	13,5	100,0	57,0	26,2	16,8	100,0	1 504
20-24	17,6	1 907	50,0	24,9	25,2	100,0	46,8	25,7	27,4	100,0	1 572
25-29	10,4	1 592	43,5	26,6	29,9	100,0	41,1	26,7	32,2	100,0	1 426
30-34	10,6	1 273	41,8	23,7	34,5	100,0	39,2	26,7	34,1	100,0	1 139
35-39	12,8	1 202	43,4	23,5	33,0	100,0	42,2	24,0	33,8	100,0	1 048
40-44	10,9	1 058	39,4	22,9	37,7	100,0	39,8	21,5	38,7	100,0	943
45-49	12,4	772	41,2	26,0	32,9	100,0	43,2	25,9	30,9	100,0	676
<b>État matrimonial</b>											
Jamais en union et n'ayant jamais eu rapports sexuels	39,3	3 059	62,2	22,4	15,4	100,0	57,0	24,9	18,2	100,0	1 857
Jamais en union ayant des rapports sexuels	16,1	490	49,5	23,5	27,0	100,0	44,4	24,9	30,7	100,0	411
En union	12,0	5 052	42,9	24,6	32,4	100,0	41,6	25,0	33,4	100,0	4 444
Divorcées/Séparée/Veuve	12,4	1 820	41,3	27,2	31,5	100,0	40,6	27,4	32,0	100,0	1 595
<b>Milieu de résidence</b>											
Kigali Ville/PVK	10,8	553	47,5	23,3	29,2	100,0	46,4	24,2	29,4	100,0	493
Autres villes	14,8	1 243	42,9	23,8	33,3	100,0	38,5	26,9	34,6	100,0	1 058
Total urbain	13,6	1 796	44,4	23,7	32,0	100,0	41,0	26,0	32,9	100,0	1 552
Rural	21,7	8 625	47,9	24,8	27,3	100,0	45,9	25,3	28,8	100,0	6 755
<b>Préfecture</b>											
Butare	18,0	922	43,7	20,9	35,4	100,0	39,9	23,9	36,3	100,0	756
Byumba	18,2	878	43,8	25,4	30,8	100,0	42,7	27,5	29,8	100,0	718
Cyangugu	23,1	782	51,0	20,4	28,6	100,0	48,1	22,5	29,4	100,0	601
Gikongoro	20,9	618	42,9	29,9	27,2	100,0	39,8	30,8	29,4	100,0	488
Gisenyi	23,9	1 163	46,3	24,4	29,3	100,0	45,0	23,8	31,3	100,0	885
Gitarama	14,6	1 137	42,5	29,1	28,4	100,0	39,9	27,5	32,6	100,0	971
Kibungo	19,7	890	49,5	22,7	27,8	100,0	45,5	23,7	30,8	100,0	714
Kibuye	24,5	561	50,5	24,4	25,1	100,0	51,4	23,1	25,5	100,0	423
Kigali Ville (PVK)	10,8	553	47,5	23,3	29,2	100,0	46,4	24,2	29,4	100,0	493
Kigali Rural	16,9	1 434	52,7	22,5	24,9	100,0	49,5	26,8	23,7	100,0	1 192
Ruhengeri	29,7	1 140	49,7	26,5	23,7	100,0	48,9	24,7	26,4	100,0	801
Umutara	23,4	345	43,7	27,1	29,2	100,0	40,2	25,7	34,0	100,0	264
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucun	24,7	2 549	47,7	27,1	25,3	100,0	47,7	26,5	25,8	100,0	1 919
Primaire/Alphabétisation	21,2	6 763	49,6	24,0	26,5	100,0	46,7	25,3	28,0	100,0	5 332
Secondaire ou plus	4,7	1 109	34,8	23,1	42,1	100,0	31,1	24,2	44,7	100,0	1 056
Ensemble	20,3	10 421	47,3	24,6	28,2	100,0	45,0	25,4	29,6	100,0	8 307

**Tableau 1.10.2 Connaissance des hommes des infections sexuellement transmissibles (IST)**

Pourcentage d'hommes n'ayant pas entendu parler d'IST (en dehors du Sida) et répartition (en %) de ceux qui en ont entendu parler selon leur connaissance des signes ou symptômes d'IST chez la femme et chez l'homme, et selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Pourcentage qui n'a pas entendu parler d'IST		Connaissance des hommes des signes et symptômes chez la femme				Connaissance des hommes des signes et symptômes chez l'homme				Effectif d'hommes qui ont entendu parler d'IST
	Effectif d'hommes		Ne connaît aucun signe ou symptôme	Connaît un signe ou symptôme	Connaît 2+ signes ou symptômes	Total	Ne connaît aucun signe ou symptôme	Connaît un signe ou symptôme	Connaît 2+ signes ou symptômes	Total	
<b>Groupe d'âges</b>											
15-19	762	32,4	69,3	17,5	13,2	100,0	41,0	34,6	24,3	100,0	515
20-24	433	7,8	61,4	17,4	21,2	100,0	29,3	29,0	41,7	100,0	399
25-29	359	5,9	57,5	17,3	25,3	100,0	19,3	26,2	54,5	100,0	337
30-34	269	6,2	53,4	15,6	31,0	100,0	17,7	24,7	57,7	100,0	252
35-39	262	5,0	48,9	20,9	30,2	100,0	18,6	24,6	56,8	100,0	249
40-44	273	4,8	51,7	16,8	31,5	100,0	18,3	23,6	58,1	100,0	259
45-49	175	5,1	44,3	20,5	35,2	100,0	16,9	25,4	57,7	100,0	166
50-54	126	6,3	46,3	18,2	35,5	100,0	22,9	23,6	53,5	100,0	118
55-59	60	9,6	51,5	14,8	33,7	100,0	22,5	27,4	50,0	100,0	54
<b>État matrimonial</b>											
Jamais en union et n'ayant jamais eu rapports sexuels	783	31,6	68,8	16,2	14,9	100,0	40,4	32,9	26,7	100,0	536
Jamais en union ayant des rapports sexuels	440	7,5	58,7	19,1	22,2	100,0	22,8	28,4	48,8	100,0	407
En union	1 416	5,6	52,8	17,6	29,6	100,0	20,9	25,1	54,0	100,0	1 337
Divorcé/Séparé/Veuf	78	11,0	40,3	24,1	35,6	100,0	15,9	34,0	50,1	100,0	69
<b>Milieu de résidence</b>											
Kigali Ville/PVK	186	6,5	62,6	14,4	23,0	100,0	21,5	28,0	50,4	100,0	174
Autres villes	350	7,3	51,6	15,7	32,7	100,0	22,4	23,6	54,0	100,0	325
Total urbain	537	7,0	55,5	15,2	29,3	100,0	22,1	25,1	52,8	100,0	499
Rural	2 180	15,1	57,6	18,4	24,0	100,0	26,4	28,4	45,1	100,0	1 850
<b>Préfecture</b>											
Butare	222	14,0	65,4	12,0	22,6	100,0	25,4	24,8	49,8	100,0	191
Byumba	255	12,2	56,7	17,6	25,7	100,0	25,7	24,1	50,3	100,0	224
Cyangugu	241	12,9	59,3	15,7	25,0	100,0	31,5	24,1	44,4	100,0	210
Gikongoro	171	16,8	54,4	22,8	22,8	100,0	24,1	32,3	43,7	100,0	142
Gisenyi	291	12,2	51,2	20,2	28,7	100,0	24,8	27,9	47,3	100,0	256
Gitarama	266	11,7	55,5	17,0	27,5	100,0	29,1	28,6	42,3	100,0	235
Kibungo	236	18,0	53,8	18,1	28,0	100,0	18,1	27,5	54,4	100,0	194
Kibuye	148	16,2	54,2	21,9	23,9	100,0	26,5	23,2	50,3	100,0	124
Kigali Ville (PVK)	186	6,5	62,6	14,4	23,0	100,0	21,5	28,0	50,4	100,0	174
Kigali Rural	347	14,1	67,3	16,4	16,4	100,0	27,1	35,5	37,4	100,0	298
Ruhengeri	278	13,2	48,0	21,6	30,4	100,0	25,1	25,7	49,1	100,0	242
Umutara	74	19,4	50,6	13,3	36,1	100,0	22,9	27,7	49,4	100,0	60
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucun	473	16,4	60,2	18,2	21,7	100,0	27,3	31,8	40,9	100,0	395
Primaire/Alphabétisation	1 857	15,4	60,0	16,7	23,3	100,0	28,4	27,7	43,9	100,0	1 572
Secondaire ou plus	387	1,2	42,2	21,5	36,3	100,0	11,6	23,8	64,6	100,0	382
Ensemble	2 717	13,5	57,1	17,7	25,2	100,0	25,5	27,7	46,8	100,0	2 350

## Prévalence déclarée d'IST

Une faible proportion de femmes (1 %) ont déclaré spontanément avoir eu une IST au cours des douze derniers mois précédant l'enquête (tableau 1.11). Il est fort probable que cette prévalence déclarée soit sous-estimée du fait que certaines femmes n'osent pas avouer ce type de maladies et du fait que certaines femmes ne connaissent pas les signes et symptômes d'IST. Par ailleurs, on

Tableau 1.11 Prévalence déclarée des infections sexuellement transmissibles (IST)

Pourcentages de femmes et d'hommes qui ont déjà eu des rapports sexuels par prévalence déclarée de différentes Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et ou des symptômes associés aux IST au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Femmes					Hommes				
	Pourcentage qui ont déclaré avoir eu, au cours des 12 derniers mois :					Pourcentage qui ont déclaré avoir eu, au cours des 12 derniers mois :				
	Une IST	Pertes vaginales anormales	Plaie ou ulcère génital	Une IST pertes vaginales, ou plaie/ulcère génital	Effectif de femmes	Une IST	Un écoulement du pénis	Une plaie ou un ulcère génital	Une IST, un écoulement ou une plaie/ulcère génital	Effectif d'hommes
<b>Groupe d'âges</b>										
15-19	0,8	2,9	1,6	3,4	354	1,3	0,7	1,5	2,9	163
20-24	1,1	2,5	1,7	3,3	1 280	0,5	0,7	1,5	2,3	284
25-29	0,7	2,1	0,8	2,6	1 462	1,0	2,3	0,7	2,6	329
30-34	1,5	2,6	2,0	3,7	1 248	0,5	1,2	0,5	1,5	265
35-39	0,5	1,8	0,8	2,1	1 191	1,3	1,2	2,0	3,2	262
40-44	0,6	2,0	1,2	2,0	1 054	0,4	0,5	0,7	1,2	270
45-49	0,5	1,2	1,0	1,8	770	0,0	0,7	0,0	0,7	175
50-54	-	-	-	-	-	2,8	2,2	0,0	2,8	126
55-59	-	-	-	-	-	0,6	0,6	1,2	1,2	60
<b>État matrimonial</b>										
Jamais en union et ayant des rapports sexuels	1,3	3,7	1,8	4,6	490	1,5	2,2	1,4	3,5	440
En union	0,8	1,9	1,2	2,6	5 051	0,6	0,9	0,9	1,7	1 415
Divorcé(e)/séparé(e)/veuve	0,8	2,3	1,3	2,5	1 820	2,2	1,2	0,0	2,2	78
<b>Milieu de résidence</b>										
Kigali Ville/PVK	2,5	6,6	3,3	7,6	342	1,5	2,3	1,3	3,3	140
Autres villes	2,0	2,7	2,4	4,0	826	0,1	0,6	0,8	1,4	258
Total urbain	2,1	3,8	2,7	5,1	1 168	0,6	1,2	0,9	2,1	398
Rural	0,6	1,8	1,0	2,2	6 192	0,9	1,2	0,9	2,1	1 535
<b>Préfecture</b>										
Butare	0,8	2,1	1,4	2,8	620	2,5	2,5	0,8	4,8	147
Byumba	0,5	2,6	0,5	2,6	646	0,7	2,0	1,4	2,7	177
Cyangugu	1,2	2,7	2,3	3,6	518	1,2	1,2	1,2	1,9	155
Gikongoro	0,6	1,8	0,4	1,8	437	0,7	0,7	1,5	2,2	121
Gisenyi	0,4	1,3	2,2	2,6	879	0,0	0,0	0,8	0,8	244
Citarama	0,7	1,6	1,0	2,0	773	0,0	1,3	0,0	1,3	199
Kibungo	1,6	2,4	1,3	3,1	631	2,8	1,4	2,8	3,5	152
Kibuye	0,0	0,9	0,4	0,9	426	0,0	0,0	1,5	1,5	106
Kigali Ville (PVK)	2,5	6,6	3,3	7,6	342	1,5	2,3	1,3	3,3	140
Kigali Rural	0,7	2,5	0,8	2,9	964	0,6	0,6	0,6	1,2	231
Ruhengeri	0,8	1,4	1,1	1,8	868	0,0	1,4	0,0	1,4	203
Umutara	0,8	1,4	1,4	2,2	256	1,3	1,3	0,0	2,5	57
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucun	0,5	1,0	0,8	1,4	2 189	0,6	0,6	0,9	1,2	389
Primaire/Alphabétisation	0,8	2,4	1,3	2,9	4 418	1,0	1,2	1,1	2,3	1 238
Secondaire ou plus	1,7	4,0	2,7	5,2	754	0,4	2,0	0,5	2,3	307
<b>Ensemble</b>	0,8	2,1	1,3	2,7	7 361	0,8	1,2	0,9	2,1	1 933

a essayé de déterminer si les femmes avaient présenté des symptômes d'IST au cours des 12 derniers mois : 2 % des femmes ont déclaré avoir eu des pertes vaginales malodorantes et 1 % ont déclaré avoir eu une plaie ou un ulcère génital. La prévalence totale déclarée d'IST (selon les déclarations spontanées et selon les symptômes) estimée ici à 3 %, doit être prise comme un ordre de grandeur et non comme une estimation précise car la présence de ces différents symptômes ou signes ne sont pas toujours la preuve d'une IST. On constate néanmoins que les femmes de la ville de Kigali et celles de niveau secondaire ou plus, seraient celles ayant eu le plus fréquemment des IST.

Une proportion d'hommes similaire à celle des femmes (1 %) ont déclaré spontanément avoir eu une IST (tableau 1.11). De plus, 1 % des hommes ont déclaré avoir eu un écoulement du pénis et 1 % avoir eu une plaie ou un ulcère génital. Globalement, d'après les déclarations spontanées et/ou les symptômes, 2 % des hommes auraient eu une IST au cours des 12 derniers mois.

### ***IST et comportement***

Parmi les femmes identifiées comme ayant eu une IST au cours des 12 derniers mois, moins de la moitié (47 %) ont déclaré avoir recherché des conseils ou un traitement, 52 % ont informé leur(s) partenaire(s) de leur état, mais 59 % n'avaient pris aucune mesure pour éviter d'infecter leur(s) partenaire(s) (tableau 1.12). Parmi les mesures prises, 23 % des femmes ont demandé à leur partenaire d'utiliser le condom et une proportion similaire d'entre elles ont eu recours aux médicaments et seulement 3 % ont évité les rapports sexuels. Une minorité (4 %) ont estimé non nécessaire l'adoption de mesures puisque le partenaire était déjà infecté.

Tableau 1.12 Protection du mari/partenaire par les femmes qui ont une infection sexuellement transmissible (IST)

Parmi les femmes qui ont déclaré avoir eu une/des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, pourcentage de celles qui ont cherché des conseils ou un traitement la dernière fois qu'elles ont eu une IST, pourcentage de celles qui ont informé leur(s) partenaire(s) et pourcentage de celles ayant pris des mesures spécifiques pour éviter d'infecter leur partenaire selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Pourcentage qui ont cherché conseils/traitement	Pourcentage qui ont informé le ou les partenaire(s)	Mesures prises pour éviter le(s) partenaire(s)				Pourcentage qui n'ont rien fait	Partenaire déjà infecté	Effectif de femmes qui ont déjà eu une IST
			A évité les rapports sexuels	A utilisé les condoms	A pris des médicaments	A pris au moins une des mesures			
<b>Groupe d'âges</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	12
15-19	(47,6)	(56,8)	(3,1)	(32,0)	(25,5)	(36,3)	(3,1)	(57,6)	44
20-24	49,0	70,7	2,6	36,9	37,1	47,3	5,7	40,1	40
25-29	49,7	60,3	1,4	22,1	19,8	26,3	6,6	64,1	47
30-34	(46,1)	(37,3)	(0,0)	(20,9)	(14,1)	(29,5)	(5,4)	(60,0)	25
35-39	(38,0)	(26,4)	(1,6)	(3,2)	(11,4)	(13,0)	(0,0)	(80,7)	21
40-44	*	*	*	*	*	*	*	*	14
45-49									
<b>État matrimonial</b>									
Jamais en union et ayant des rapports sexuels	(38,9)	(28,1)	(13,3)	(28,9)	(21,1)	(36,3)	(0,0)	(58,1)	23
En union	47,8	66,9	1,9	26,1	27,1	37,0	3,6	55,5	133
Divorcée/Séparée/Veuve	47,6	21,2	2,9	12,7	10,2	15,6	6,9	70,4	47
<b>Milieu de résidence</b>									
Kigali Ville/PVK	55,1	55,1	5,1	41,0	43,6	50,0	1,3	43,6	27
Autres villes	(64,0)	(64,2)	(4,0)	(49,8)	(32,2)	(49,8)	(4,0)	(35,1)	33
Total urbain	60,1	60,2	4,5	45,9	37,2	49,9	2,8	38,8	60
Rural	41,2	48,6	3,0	13,9	16,3	24,5	4,5	67,8	143
<b>Niveau d'instruction</b>									
Aucun	(45,4)	(31,7)	(6,2)	(3,4)	(15,3)	(21,5)	(6,2)	(62,7)	30
Primaire/Alphabétisation	42,7	54,5	3,3	21,5	20,1	29,4	4,4	62,1	134
Secondaire ou plus	(61,8)	(59,3)	(1,8)	(45,3)	(36,6)	(49,2)	(0,9)	(46,7)	39
Ensemble	46,7	52,0	3,4	23,4	22,5	32,0	4,0	59,2	203

Note : La préfecture n'apparaît pas dans le tableau vu le faible effectif.

\* Basé sur trop peu de cas non-pondérés.

( ) Basé sur un faible nombre de cas non-pondérés

## 1.6 NOMBRE DE PARTENAIRES SEXUELS

Au cours de l'EDSR-II, on a cherché à connaître le nombre de partenaires sexuels des enquêtés au cours des douze mois ayant précédé l'enquête. La multiplicité des partenaires sexuels est en relation directe avec le risque de contracter les infections sexuellement transmissibles en cas de relations non protégées. Il est néanmoins bon de rappeler que les déclarations des enquêtés sur le nombre de partenaires peuvent ne pas toujours traduire fidèlement la réalité du fait que certains enquêtés ne déclarent pas leurs partenaires sexuels, considérant que cela fait partie de leur vie privée.

La quasi-totalité des femmes en union (95 %) ont déclaré n'avoir eu qu'un seul partenaire sexuel (y compris le conjoint) au cours des 12 derniers mois; 4 % ont déclaré ne pas avoir eu de partenaire et une infime minorité (0,1 %) ont déclaré avoir eu deux partenaires ou plus (tableau 1.13.1). Le nombre moyen de partenaires sexuels, y compris le conjoint, rapporté par les femmes en union, est de 1,0 et ce nombre ne varie pas selon la différence de caractéristiques socio-démographiques.

**Tableau 1.13.1 Nombre de partenaires sexuels des femmes**

Répartition (en %) de femmes actuellement en union, de femmes pas en union, par nombre de partenaires sexuels avec qui elles ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête et le nombre moyen de ces partenaires, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Femmes en union								Femmes pas en union					
	Nombre de partenaires (y compris le conjoint)				Nombre de partenaires (non compris le conjoint)				Effectif de femmes en union	Nombre de partenaires			Effectif de femmes pas en union	
	0	1	2+	Nombre moyen de partenaires	0	1	2+	Nombre moyen de partenaires						
<b>Groupe d'âges</b>														
15-19	0,0	98,1	1,1	1,0	97,7	1,5	0,0	0,0	172	97,6	2,2	0,2	0,0	2 445
20-24	1,6	98,3	0,2	1,0	99,5	0,5	0,0	0,0	963	92,5	6,8	0,7	0,1	944
25-29	2,7	97,1	0,2	1,0	99,4	0,5	0,0	0,0	1 120	86,7	12,8	0,4	0,1	472
30-34	3,9	95,7	0,2	1,0	99,4	0,4	0,0	0,0	902	85,1	13,5	1,5	0,2	371
35-39	6,9	92,7	0,0	0,9	99,3	0,3	0,0	0,0	811	87,7	11,9	0,3	0,1	392
40-44	7,2	92,5	0,0	0,9	98,7	1,0	0,0	0,0	649	92,0	8,0	0,0	0,1	409
45-49	8,9	91,1	0,0	0,9	99,5	0,5	0,0	0,0	435	98,3	1,1	0,2	0,0	337
<b>Milieu de résidence</b>														
Kigali Ville/PVK	2,0	97,7	0,3	1,0	98,7	1,2	0,2	0,0	206	90,7	8,3	0,8	0,1	347
Autres villes	2,2	97,5	0,3	1,0	98,9	1,1	0,0	0,0	535	90,7	8,2	1,1	0,1	708
Total urbain	2,2	97,6	0,3	1,0	98,8	1,1	0,0	0,0	741	90,7	8,3	1,0	0,1	1 055
Rural	4,8	94,9	0,1	1,0	99,3	0,5	0,0	0,0	4 311	94,6	5,2	0,2	0,1	4 314
<b>Préfecture</b>														
Butare	7,9	92,1	0,0	0,9	99,7	0,3	0,0	0,0	381	94,5	5,2	0,3	0,1	541
Byumba	0,5	99,1	0,0	1,0	99,1	0,5	0,0	0,0	508	93,3	6,7	0,0	0,1	370
Cyangugu	3,7	96,1	0,2	1,0	99,5	0,5	0,0	0,0	374	95,5	4,3	0,2	0,0	408
Gikongoro	4,1	95,4	0,0	1,0	99,2	0,3	0,0	0,0	323	93,4	6,6	0,0	0,1	295
Gisenyi	3,5	96,2	0,3	1,0	99,4	0,6	0,0	0,0	644	93,4	5,8	0,7	0,1	519
Gitarama	6,8	93,2	0,0	0,9	99,0	1,0	0,0	0,0	480	94,1	5,7	0,0	0,1	656
Kibungo	8,8	90,7	0,3	0,9	99,0	0,8	0,0	0,0	404	93,9	5,9	0,2	0,1	485
Kibuye	5,4	94,6	0,0	0,9	99,7	0,3	0,0	0,0	304	93,3	6,1	0,6	0,1	256
Kigali Ville (PVK)	2,0	97,7	0,3	1,0	98,7	1,2	0,2	0,0	206	90,7	8,3	0,8	0,1	347
Kigali Rural	5,3	94,1	0,4	1,0	98,7	1,1	0,0	0,0	641	94,0	5,3	0,7	0,1	793
Ruhengeri	1,3	98,2	0,0	1,0	99,6	0,0	0,0	0,0	609	93,2	6,3	0,5	0,1	531
Umutara	4,8	95,2	0,0	1,0	100,0	0,0	0,0	0,0	178	97,0	3,0	0,0	0,0	167
<b>Niveau d'instruction</b>														
Aucun	4,9	94,9	0,1	1,0	99,4	0,4	0,0	0,0	1 453	93,6	6,3	0,1	0,1	1 096
Primaire/Alphabétisation	4,5	95,1	0,2	1,0	99,1	0,6	0,0	0,0	3 087	94,5	5,0	0,4	0,1	3 676
Secondaire ou plus	2,2	97,8	0,0	1,0	99,6	0,4	0,0	0,0	512	89,6	10,1	0,3	0,1	597
<b>Ensemble</b>	4,4	95,3	0,1	1,0	99,3	0,6	0,0	0,0	5 052	93,8	5,8	0,4	0,1	5 369

Si l'on exclut le conjoint, la quasi-totalité des femmes en union (99 %) n'auraient eu aucun partenaire au cours des 12 derniers mois et une infime minorité (0,6 %) en auraient eu un ou plus.

Chez les femmes non en union, la quasi-totalité (94 %) ont déclaré n'avoir eu aucun partenaire et 6 % en avoir eu un seul. Le nombre moyen de partenaire parmi cette catégorie de femmes est de 0,1 et il ne présente que très peu de variations selon les différentes caractéristiques.

Parmi les hommes en union, 96 % ont déclaré n'avoir eu qu'une seule partenaire (y compris l'épouse) et 3 % ont déclaré deux partenaires ou plus (tableau 1.13.2). Le nombre moyen de personnes (y compris le conjoint) avec qui les hommes en union ont eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois est de 1,0. Si on exclut l'épouse, 2 % seulement des hommes auraient eu une partenaire sexuelle au cours des 12 derniers mois et 0,1 % deux partenaires ou plus. Du point de vue des caractéristiques socio-démographiques, les niveaux varient très peu.

Tableau 1.13.2 Nombre de partenaires sexuels des hommes

Répartition (en %) d'hommes actuellement en union, d'hommes pas en union, par nombre de partenaires sexuelles avec qui ils ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête et le nombre moyen de ces partenaires, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Hommes en union								Hommes pas en union					
	Nombre de partenaires (y compris le conjoint)				Nombre de partenaires (non compris le conjoint)				Effectif d'hommes en union	Nombre de partenaires			Effectif d'hommes pas en union	
	0	1	2+	Nombre moyen de partenaires	0	1	2+	Nombre moyen de partenaires		0	1	2+		
<b>Groupe d'âges</b>														
15-19	*	*	*	*	*	*	*	*	11	93,6	5,5	0,9	0,1	751
20-24	0,9	98,3	0,8	1,0	98,6	1,4	0,0	0,0	122	84,7	13,4	1,9	0,2	311
25-29	0,0	98,1	1,9	1,0	99,0	1,0	0,0	0,0	228	69,2	26,3	4,5	0,4	131
30-34	0,0	97,1	2,9	1,0	98,5	1,5	0,0	0,0	235	(56,6)	(40,1)	(3,3)	(0,5)	34
35-39	0,3	97,1	2,3	1,0	98,1	1,6	0,0	0,0	242	*	*	*	*	20
40-44	0,0	95,3	4,7	1,0	97,1	2,9	0,0	0,0	247	(76,5)	(23,5)	(0,0)	(0,2)	26
45-49	0,0	94,3	5,7	1,1	97,5	2,5	0,0	0,0	166	*	*	*	*	9
50-54	0,6	94,1	5,3	1,1	96,0	3,0	1,0	0,1	115	*	*	*	*	11
55-59	5,9	93,4	0,7	1,0	99,3	0,0	0,7	0,0	52	*	*	*	*	8
<b>Milieu de résidence</b>														
Kigali Ville/PVK	1,0	93,2	4,8	1,0	92,8	5,8	0,5	0,1	73	74,6	21,3	4,1	0,4	113
Autres villes	0,9	96,7	2,4	1,0	98,3	1,7	0,0	0,0	163	81,0	16,5	2,6	0,2	187
Total urbain	0,9	95,6	3,2	1,0	96,6	2,9	0,1	0,0	237	78,6	18,3	3,1	0,3	300
Rural	0,4	96,4	3,2	1,0	98,3	1,6	0,1	0,0	1 179	89,6	9,2	1,1	0,1	1 001
<b>Préfecture</b>														
Butare	0,0	98,8	1,2	1,0	98,8	0,0	1,2	0,0	96	81,9	15,6	2,5	0,2	126
Byumba	0,0	100,0	0,0	1,0	100,0	0,0	0,0	0,0	141	90,5	8,4	1,1	0,1	114
Cyangugu	0,8	96,8	2,4	1,0	98,4	1,6	0,0	0,0	121	93,5	6,5	0,0	0,1	119
Gikongoro	0,0	96,4	3,6	1,0	98,2	1,8	0,0	0,0	99	92,5	5,0	2,5	0,1	72
Gisenyi	0,0	96,6	3,4	1,0	97,8	2,2	0,0	0,0	176	87,9	10,3	1,7	0,1	115
Gitarama	0,0	96,3	3,7	1,0	98,1	1,9	0,0	0,0	138	88,9	11,1	0,0	0,1	128
Kibungo	2,2	87,9	9,9	1,1	93,4	6,6	0,0	0,1	97	87,0	10,7	2,3	0,2	139
Kibuye	0,0	96,5	3,5	1,0	98,2	1,8	0,0	0,0	91	94,4	5,6	0,0	0,1	57
Kigali Ville (PVK)	1,0	93,2	4,8	1,0	92,8	5,8	0,5	0,1	73	74,6	21,3	4,1	0,4	113
Kigali Rural	0,8	97,5	1,7	1,0	99,2	0,8	0,0	0,0	167	86,0	13,2	0,8	0,1	180
Ruhengeri	0,0	96,6	3,4	1,0	99,2	0,8	0,0	0,0	168	84,6	12,8	2,6	0,2	110
Umutara	3,1	93,8	3,1	1,0	98,5	1,5	0,0	0,0	47	(94,7)	(2,6)	(2,6)	(0,1)	27
<b>Niveau d'instruction</b>														
Aucun	1,0	96,3	2,7	1,0	99,0	1,0	0,0	0,0	327	88,6	10,6	0,7	0,1	146
Primaire/Alphabétisation	0,4	95,9	3,7	1,0	97,6	2,2	0,2	0,0	905	89,2	9,6	1,3	0,1	952
Secondaire ou plus	0,0	98,5	1,4	1,0	98,3	1,5	0,0	0,0	184	76,0	20,2	3,9	0,3	203
Ensemble	0,5	96,3	3,2	1,0	98,0	1,8	0,1	0,0	1 416	87,1	11,3	1,6	0,2	1 301

\* Basé sur trop peu de cas non-pondérés.

() Basé sur un faible nombre de cas non-pondérés

Parmi les hommes non en union, la situation est un peu différente. La majorité (87 %) a déclaré n'avoir pas eu de partenaire sexuelle au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, 11 % ont indiqué avoir eu une seule partenaire et 2 % pour deux partenaires ou plus. Le nombre moyen de partenaires est de 0,2.

## 1.7 CONNAISSANCE ET UTILISATION DU CONDOM

L'utilisation du condom est vitale puisque c'est le seul moyen disponible pour se protéger contre les IST et le VIH/Sida lorsqu'on a des rapports sexuels avec un partenaire dont le statut sérologique est inconnu. Les résultats relatifs à la connaissance et à l'utilisation du condom portent sur les enquêtés qui connaissent l'existence du VIH/Sida et qui ont déjà eu des rapports sexuels. Trois aspects sont abordés dans cette section : la connaissance du condom (condom masculin et féminin), la connaissance d'une source d'approvisionnement et l'utilisation du condom.

L'analyse du tableau 1.14.1 révèle que 92 % des femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels et qui connaissent le VIH/Sida connaissent le condom masculin et un quart des femmes (27 %) connaissent le condom féminin. Alors que peu de variations du niveau de connaissance apparaissent selon les caractéristiques socio-démographiques pour le condom masculin, la connaissance du condom féminin varie d'un minimum de 19 % chez les femmes sans instruction à un maximum de 49 % chez les femmes de niveau secondaire ou plus.

Parmi les femmes connaissant le condom, 24 % connaissent une source d'approvisionnement dans le secteur médical public, 1 % dans le secteur médical privé, 9 % dans les pharmacies privées et 13 % en dehors du secteur médical. Par ailleurs, un quart des femmes (24 %) ont déclaré pouvoir se procurer elles-même un condom en cas de besoin. Globalement, les femmes qui ne connaissent pas une source d'approvisionnement et celles qui ne pourraient pas se procurer un condom elles-mêmes en cas de besoin sont considérées comme ayant des problèmes d'accès au condom. Deux tiers des femmes connaissant le condom sont dans cette situation (64 %) : il s'agit plus particulièrement des femmes de 40-49 ans (72 %), de celles du milieu rural (71 %), de celles de Kibuye (86 %) et des femmes sans instruction (82 %).

Une infime proportion de femmes (1 %) ont déclaré avoir utilisé le condom au cours de leurs derniers rapports sexuels, que ces rapports aient eu lieu au cours du dernier mois ou plus tôt.

Quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques, la quasi-totalité des hommes (99 %) connaissent le condom (tableau 1.14.2). Parmi ceux-la, 27 % connaissent une source d'approvisionnement dans le secteur médical public, 2 % dans le secteur médical privé, et 33 % dans le secteur non médical. Par ailleurs, plus de la moitié des hommes (58 %) ont déclaré pouvoir se procurer un condom en cas de besoin. Globalement, les hommes qui ne connaissent pas une source d'approvisionnement et qui ne pourraient pas se procurer un condom en cas de besoin sont considérés comme ayant des problèmes d'accès au condom. Un peu moins de la moitié des hommes connaissant le condom (42 %) est dans cette situation : il s'agit plus particulièrement de ceux de 30-59 ans (pourcentage croissant de 37 % à 81 %), de ceux divorcés, séparés ou veufs (56 %), ceux du milieu rural (49 %, contre 19 % pour le milieu urbain), ceux vivant à Kibuye (66 %) et des hommes sans instruction (66 %, contre 14 % de niveau secondaire ou plus).

Les hommes déclarant avoir utilisé le condom au cours des derniers rapports sexuels au cours du dernier mois avant l'enquête, sont relativement peu nombreux (2 %). Ceux qui l'ont utilisé au cours de rapports sexuels, un peu plutôt, sont de 4 %. On peut noter cependant que ces pourcentages sont relativement plus élevés parmi les jeunes de 15-29 ans, les célibataires (5 %), ceux de Kigali Ville (5 %), et ceux de niveau d'instruction secondaire ou plus (6 %).

Tableau 1.14.1 Connaissance et utilisation du condom par les femmes

Parmi les femmes qui connaissent le VIH/sida et qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui connaissent le condom féminin, et parmi celles qui connaissent le condom, pourcentage qui ont utilisé au cours du dernier rapport sexuel, et pourcentage qui l'utilisent comme contraceptif mais ne l'ont pas utilisé au cours du dernier rapport sexuel, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Pourcentage qui connaissent le condom féminin	Pourcentage qui connaissent le condom mais ne l'ont pas utilisé au cours du dernier rapport sexuel	Effectif de femmes qui ont eu le VIH/sida et qui ont eu des rapports sexuels	Pourcentage qui ont utilisé le condom au cours des derniers rapports sexuels			Plus tôt	Au cours du dernier mois avant l'enquête	Pourcentage qui ont utilisé le condom mais pas utilisé aux derniers rapports sexuels	Effectif de femmes qui connaissent le condom
				Pourcentage qui ont utilisé le condom au cours des derniers rapports sexuels	Pourcentage qui ont utilisé le condom mais pas utilisé aux derniers rapports sexuels	Pourcentage qui ont utilisé le condom mais pas utilisé aux derniers rapports sexuels				
<b>Groupe d'âges</b>										
15-19	24,5	91,4	352	23,4	61,6	5,0	1,1	0,1	322	
20-24	26,1	92,8	1 280	16,5	62,4	0,9	0,7	0,5	1 189	
25-29	28,9	92,5	1 460	14,6	59,3	0,8	0,5	0,5	1 350	
30-34	29,7	93,5	1 247	13,2	61,0	0,7	0,3	0,2	1 166	
35-39	27,4	91,7	1 190	11,2	65,3	0,0	0,3	0,1	1 091	
40-45	27,2	93,1	1 051	16,9	70,7	0,1	0,1	0,0	979	
45-49	23,9	86,7	765	13,7	73,3	0,0	0,4	0,0	663	
<b>État matrimonial</b>										
Jamais en union et ayant des rapports sexuels	25,2	96,1	487	29,6	53,6	6,0	1,5	0,8	467	
En union	28,0	91,9	5 042	12,0	64,6	0,1	0,4	0,2	4 634	
Divorcée/Séparée/Veuve	26,0	91,3	1 817	18,8	66,3	0,8	0,2	0,2	1 658	
<b>Milieu de résidence</b>										
Kigali Ville/PVK	36,0	95,6	341	59,6	24,9	2,9	2,4	1,1	326	
Autres villes	35,4	96,2	826	34,2	36,2	2,9	0,8	0,8	795	
Total urbain	35,6	96,0	1 168	41,6	32,9	2,9	1,2	0,9	1 122	
Rural	25,8	91,3	6 178	7,7	70,5	0,3	0,3	0,1	5 638	
<b>Préfecture</b>										
Butare	32,7	95,9	620	13,1	62,4	0,3	0,2	0,0	595	
Byumba	27,9	91,7	644	8,4	58,7	0,2	1,0	0,4	591	
Cyangugu	25,3	92,3	518	18,1	72,8	0,6	0,6	0,0	478	
Gikongoro	28,1	91,7	436	16,3	75,3	0,2	0,2	0,0	400	
Gisenyi	24,6	88,1	877	12,5	71,3	1,0	0,0	0,2	773	
Gitarama	27,8	95,8	773	14,1	59,8	0,3	0,0	0,2	741	
Kibungo	25,3	91,9	630	24,7	62,3	0,2	0,7	0,4	579	
Kibuye	21,9	88,1	422	9,5	85,8	0,6	0,0	0,2	372	
Kigali Ville (PVK)	36,0	95,6	341	59,6	24,9	2,9	2,4	1,1	326	
Kigali Rural	27,0	91,8	962	18,8	51,9	1,1	0,5	0,0	883	
Ruhengeri	25,3	89,5	867	16,0	75,2	1,0	0,2	0,5	776	
Umutara	34,6	96,7	255	18,6	72,5	0,0	0,3	0,0	247	
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucun	19,3	87,3	2 177	4,5	81,9	0,1	0,1	0,0	1 900	
Primaire/Alphabétisation	27,6	93,2	4 415	12,2	63,5	0,5	0,4	0,2	4 114	
Secondaire ou plus	48,8	99,0	754	41,8	23,3	3,1	1,1	1,2	746	
Ensemble	27,3	92,0	7 345	13,3	64,2	0,7	0,4	0,2	6 760	

Note : Le mot « condom » utilisé seul, indique le condom porté par les hommes (condom masculin), comme c'est le cas dans le reste du rapport.

Tableau 1.14.2. Connaissance et utilisation du condom par les hommes

Parmi les hommes qui connaissent le VIH/sida et qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui connaissent le condom, et parmi ceux qui connaissent le condom, pourcentage qui connaissent un endroit où s'en procurer, pourcentage qui l'ont utilisé au cours du dernier rapport sexuel, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Pourcentage qui connaissent le condom	Effectif d'hommes qui connaissent le VIH/sida et qui ont eu rapports sexuels	Pourcentage qui se procurer un condom			Autre	Pourcentage qui pour- raient se procurer un condom s'ils le voulaient	Pour- centage qui ne connaissent pas une source où se procurer un condom	Pourcentage qui ont utilisé le condom au cours des derniers rapports sexuels		Effectif d'hommes qui connaissent le condom
			Source médicale publique	Source médicale privée	Pharmacie privée				Au cours du dernier mois avant l'enquête	Plus tôt	
<b>Groupe d'âges</b>											
15-19	100,0	163	21,9	1,3	27,0	51,4	71,1	25,9	2,8	11,9	163
20-24	99,1	284	32,1	2,5	35,4	44,8	71,6	24,6	2,2	9,0	282
25-29	98,7	327	44,3	2,9	29,6	38,8	72,8	24,2	4,5	4,8	322
30-34	99,3	265	41,3	2,5	25,0	33,3	62,6	32,5	1,9	1,7	263
35-39	99,3	262	35,4	1,8	20,3	28,0	50,9	39,8	0,1	1,3	260
40-44	99,1	268	30,9	1,3	21,0	25,6	45,0	46,8	0,4	0,1	265
45-49	98,7	175	33,4	5,5	19,0	23,2	44,2	43,0	0,7	0,8	172
50-54	98,9	126	28,4	0,9	12,9	20,9	36,8	50,1	0,3	0,0	124
55-59	98,2	60	10,5	2,4	8,9	10,0	18,8	74,3	0,6	0,0	59
<b>État matrimonial</b>											
Jamais en union et ayant des rapports sexuels	99,7	440	31,6	3,1	41,1	55,7	79,4	16,9	5,1	15,0	439
En union	98,8	1 411	35,3	2,2	19,5	26,6	51,6	40,8	0,6	0,2	1 394
Divorcé/Séparé/Veuf	100,0	78	24,5	2,2	19,4	24,8	43,5	51,2	3,7	2,3	78
<b>Milieu de résidence</b>											
Kigali Ville/PVK	100,0	140	24,1	10,7	60,4	82,5	84,3	6,6	5,1	14,7	140
Autres villes	100,0	258	28,6	2,2	58,9	64,1	79,8	11,5	5,0	6,2	258
Total urbain	100,0	398	27,0	5,2	59,4	70,5	81,4	9,8	5,0	9,2	398
Rural	98,8	1 531	35,9	1,6	15,3	23,4	51,4	42,5	0,9	2,2	1 513
<b>Préfecture</b>											
Butare	98,5	147	40,6	1,0	15,4	25,6	53,5	37,2	3,8	4,7	145
Byumba	99,3	177	43,5	2,7	15,6	31,3	53,1	34,0	1,4	2,0	176
Cyangugu	99,4	155	30,2	1,3	28,3	18,9	54,7	41,5	0,6	2,5	154
Gikongoro	98,5	121	28,0	2,3	9,1	14,4	40,2	56,1	0,8	0,8	119
Gisenyi	100,0	242	30,3	0,0	28,7	34,4	59,8	33,6	1,6	1,6	242
Gitarama	99,4	199	32,0	2,0	22,2	35,3	58,2	34,0	0,0	3,3	198
Kibungo	97,9	152	43,6	0,0	30,0	37,9	58,2	33,6	2,9	3,6	149
Kibuye	98,5	106	30,0	0,8	4,6	11,5	33,8	60,0	0,0	1,5	104
Kigali Ville (PVK)	100,0	140	24,1	10,7	60,4	82,5	84,3	6,6	5,1	14,7	140
Kigali Rural	98,2	231	40,5	4,9	27,6	37,4	69,3	26,4	1,2	4,9	227
Ruhengeri	99,3	202	33,8	0,7	21,8	29,6	55,6	39,4	2,8	2,8	201
Umurata	100,0	56	15,4	3,8	16,7	28,2	44,9	51,3	0,0	0,0	56
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucun	97,8	386	25,1	0,7	7,8	12,9	33,8	61,6	0,3	1,5	377
Primaire/Alphabétisation	99,4	1 237	34,7	2,0	21,4	32,7	58,0	34,9	1,3	3,4	1 229
Secondaire ou plus	99,5	306	42,2	5,8	57,2	60,7	85,9	7,1	5,5	7,6	305
Ensemble	99,1	1 929	34,0	2,4	24,5	33,2	57,7	35,7	1,8	3,7	1 911

L'utilisation du condom au cours des derniers rapports par les femmes qui connaissent le VIH/Sida varie fortement selon le type de partenaires (tableau 1.15). En général, quel que soit le partenaire, seulement 1,4 % des femmes ont utilisé un condom au cours de leurs derniers rapports : 1 % l'ont fait lorsque les derniers rapports ont eu lieu avec le conjoint alors que 15 % l'ont utilisé lorsque le dernier rapport a eu lieu avec quelqu'un d'autre que le conjoint. Les jeunes femmes utilisent le condom nettement plus que les autres, particulièrement s'il s'agit d'un partenaire autre que le conjoint: 28 % à 15-19 ans et 18% à 20-24 ans. Quand les rapports ont eu lieu avec un autre partenaire, le pourcentage d'utilisation est également plus important chez les femmes célibataires qui ont déjà eu des rapports sexuels (24 %), chez celles vivant à Kigali Ville (42 %), celles de Ruhengeri (22 %) et celles de niveau secondaire ou plus (36 %).

Comme chez les femmes, l'utilisation du condom au cours des derniers rapports par les hommes qui connaissent le VIH/Sida varie fortement selon le type de partenaires (tableau 1.15). Globalement, quel que soit le partenaire, 6 % des hommes ont utilisé un condom au cours de leurs derniers rapports: seulement 1 % l'ont fait lorsque les derniers rapports ont eu lieu avec leur conjointe alors que près de leur moitié (50 %) l'ont utilisé lorsque le dernier rapport a eu lieu avec une femme autre que la conjointe. Les jeunes hommes utilisent le condom nettement plus fréquemment que les autres, particulièrement s'il s'agit d'une partenaire autre que l'épouse : 49 % pour les 15-19 ans, 61 % pour les 20-24 ans et 67 % pour les 25-29 ans. Quand les rapports ont eu lieu avec une autre partenaire, le pourcentage d'utilisation est également plus important parmi les hommes célibataires (58 %), parmi ceux vivant à Kigali Ville (80 %), ceux vivant à Ruhengeri (62 %) et ceux de niveau secondaire ou plus (74 %).

**Tableau 1.15 Utilisation du condom par type de partenaire**

Parmi les femmes et les hommes qui connaissent le VIH/sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, précédant l'enquête, pourcentage de celles et de ceux qui ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels avec leur conjoint(e) ou partenaire cohabitant(e), pourcentage de celles et de ceux qui l'ont utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec quelqu'un(e) d'autre, et quel que soit le ou la partenaire, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSR-II Rwanda 2000

Caractéristique	Femmes						Hommes					
	Époux ou partenaire sexuel cohabitant		Autre partenaire sexuel		Ensemble		Épouse ou partenaire sexuelle cohabitante		Autre partenaire sexuelle		Ensemble	
	Pourcentage	Effectif de femmes	Pourcentage	Effectif de femmes	Pourcentage	Effectif de femmes	Pourcentage	Effectif d'hommes	Pourcentage	Effectif d'hommes	Pourcentage	Effectif d'hommes
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	1,9	183	28,0	58	8,2	241	0,0	10	49,3	47	40,5	58
20-24	0,7	992	17,9	69	1,8	1 059	1,2	122	60,6	49	18,4	171
25-29	0,6	1 112	15,9	65	1,4	1 177	0,6	232	66,8	43	11,0	273
30-34	0,3	891	16,1	58	1,2	949	0,9	238	40,8	18	3,6	253
35-39	0,5	770	0,0	48	0,5	818	0,1	243	41,5	12	1,5	251
40-44	0,2	609	2,9	39	0,3	648	0,3	247	8,0	13	0,6	254
45-49	0,3	403	18,3	6	0,6	410	1,6	167	0,0	4	1,6	168
50-54	-	-	-	-	-	-	0,3	114	35,8	7	0,3	118
55-59	-	-	-	-	-	-	0,7	49	0,0	0	0,7	49
<b>État matrimonial</b>												
Jamais en union et ayant des rapports sexuels	17,4	11	23,5	140	23,1	151	50,0	1	58,1	149	58,0	150
En union	0,5	4 792	6,7	23	0,5	4 814	0,7	1 405	23,5	28	0,7	1 409
Divorcé(e)/séparé(e)/veuf(veuve)	0,8	156	8,9	180	5,1	337	(0,0)	(17)	(26,3)	(18)	(13,5)	35
<b>Milieu de résidence</b>												
Kigali Ville/PVK	1,8	208	42,1	32	7,2	240	4,5	72	79,6	33	26,8	102
Autres villes	1,5	537	30,1	69	4,8	605	1,7	163	72,1	38	14,6	199
Total urbain	1,6	745	33,9	101	5,5	845	2,5	235	75,5	71	18,8	300
Rural	0,3	4 214	6,7	242	0,7	4 456	0,3	1 188	35,7	123	3,6	1 293
<b>Préfecture</b>												
Butare	0,4	362	6,6	30	0,9	392	0,6	98	49,2	24	10,2	121
Byumba	0,9	510	8,7	27	1,3	537	0,8	144	44,4	11	3,9	155
Cyangugu	0,8	367	14,3	19	1,4	386	0,8	121	40,0	10	3,8	129
Gikongoro	0,3	316	4,3	20	0,5	336	0,0	99	37,5	7	1,7	105
Gisenyi	0,3	642	15,8	36	1,1	678	0,0	180	44,4	18	4,1	194
Citarama	0,0	471	6,1	41	0,5	513	0,0	138	46,2	17	4,2	154
Kibungo	0,5	385	10,3	30	1,2	415	2,2	96	30,4	24	8,4	114
Kibuye	0,3	297	9,1	17	0,7	314	0,0	91	20,0	4	0,8	95
Kigali Ville (PVK)	1,8	208	42,1	32	7,2	240	4,5	72	79,6	33	26,8	102
Kigali Rural	0,9	617	16,7	49	2,0	664	0,8	166	47,4	26	7,3	191
Ruhengeri	0,2	613	22,2	36	1,4	649	0,0	171	61,5	18	6,0	188
Umutara	0,4	172	0,0	5	0,4	177	0,0	46	33,3	2	0,0	48
<b>Niveau d'instruction</b>												
Aucun	0,1	1 425	4,2	73	0,3	1 499	0,3	329	28,2	20	1,9	346
Primaire/Alphabétisation	0,5	3 013	12,2	208	1,3	3 220	0,5	911	44,1	124	5,5	1 015
Secondaire ou plus	1,8	521	36,0	62	5,4	583	1,9	183	73,6	51	17,0	232
<b>Ensemble</b>	0,5	4 959	14,7	344	1,4	5 301	0,7	1 423	50,3	195	6,4	1 594

( ) Basé sur un faible nombre de cas non-pondérés.